Инструкция по применению
Валидол Капсулы подъязычные 50 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 1

Описание

Капсулы шарообразной формы, от бесцветного до светло-желтого цвета, заполнены прозрачной маслянистой жидкостью с запахом ментола.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

1 капсула содержит левоментола раствор в ментил изовалерате - 50/100 мг, состав оболочки в пересчете на абсолютно сухое вещество: желатин медицинский - 17/22 мг, глицерол (глицерин) - 5/8 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14/0,18 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта. После всасывания биотрансформируется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.

Показания

Функциональные кардиалгии, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Способ применения и дозы

Валидол назначают под язык. Капсулу следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 капсуле 2-3 раза в день. Суточная кратность и продолжительность приема валидола определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или, когда у отдельных больных в ближайшие 5 мин после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

При длительном приеме валидола могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Передозировка

При передозировке препарата могут наблюдаться: головная боль, тошнота, возбужденное состояние, нарушение деятельности сердца, снижение артериального давления, угнетение ЦНС. В случае возникновения клинической картины передозировки необходимо отменить препарат и проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение вместе с нейротропными препаратами угнетающего типа действия усиливает угнетающее действие последних на ЦНС, способствует наступлению сна и его более глубокому течению. Одновременное применение Валидола с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.