Инструкция по применению
Валидол-Реневал таблетки подъязычные 0,06 г 32 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 32
Дозировка действующего вещества: 60 мг

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской и риской, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом ментола. Допускаются сероватые вкрапления.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Состав на одну таблетку:активное вещество:левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) - 0,060 гвспомогательные вещества:сахароза (сахар) -1,157 гкальция стеарат - 0,006 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме под язык терапевтический эффект наступает, в среднем, через 5 минут, при этом до 70 % препарата высвобождается в течение 3 минут.

Показания

Функциональные кардиалгии, синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни).

Способ применения и дозы

Валидол назначают под язык. Таблетку следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день. Суточная кратность и продолжительность приема валидола определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте, или когда у отдельных больных в ближайшие 5 минут после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратится к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахарозы /изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (т.к. препарат содержит сахарозу).

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью Валидол назначают лишь в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает возможное отрицательное влияние препарата на плод и грудного ребенка.

Побочные действия

При длительном приеме валидола могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Передозировка

Головная боль, тошнота, возбужденное состояние, снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы. В случае передозировки необходимо отменить препарат и назначить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном примени с другими лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременное применение препарата с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В связи с возможностью проявления побочного действия при длительном применении препарата способность управлять транспортным средством или механизмами может снижаться.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.