Инструкция по применению
Валидол с глюкозой Таблетки подъязычные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 1

Описание

Круглые плоские таблетки с фаской и риской, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с сероватыми вкраплениями, с характерным запахом ментола.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Состав на 1 таблетку: Действующие вещества: левоментола раствор в ментилизовалерате (валидол) - 60,0 мг декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 188,0 мг Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар белый) - 548,0 мг Кальция стеарат - 4,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При подъязычном применении левоментол абсорбируется со слизистой оболочки полости рта, метаболизируется в печени и выводится почками в виде глюкуронидов.

Показания

Функциональная кардиалгия, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Способ применения и дозы

Препарат Валидол с глюкозой назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 минут после приема необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (т.к. препарат содержит сахарозу и глюкозу).

Применение при беременности и кормлении грудью

Назначение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и/или ребенка.

Побочные действия

Возможны: тошнота, слезотечение, головокружение. При отмене препарата эти побочные явления обычно проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, кожный зуд, ангионевротический отек). Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: головная боль, тошнота, возбужденное состояние, нарушение деятельности сердца, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы. Лечение: отмена препарата. Симптоматическая терапия. При передозировке препарата необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременное применение препарата Валидол с глюкозой с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Валидол с глюкозой проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Следует назначать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом, т.к. одна таблетка препарата Валидол с глюкозой содержит 0,09 ХЕ (хлебных единиц). Не рекомендуется одновременный прием алкоголя. Следует не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. Необходимо обратиться к врачу в случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При приеме препарата Валидол с глюкозой необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.