Инструкция по применению
Валидол с глюкозой Таблетки подъязычные 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 60 мг

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской и риской, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом ментола. Допускаются сероватые вкрапления.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Состав на одну таблетку: активное вещество: левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) - 0,060 г декстрозы (глюкозы) моногидрат - 0,188 г вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 0,544 г кальция стеарат - 0,008 г

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта метаболизируется в печени, выводится с мочой в виде глюкуронидов. Декстрозы моногидрат полностью усваивается организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания

Функциональная кардиалгия неврозы синдром "укачивания" (тошнота рвота при морской и воздушной болезни).

Способ применения и дозы

Валидол с глюкозой назначают под язык. Таблетку следует держать во рту под языком до полного растворения. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день. При недостаточно выраженном эффекте или когда у отдельных больных в ближайшие 5 минут после приема препарата эффект не наблюдается необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата нарушение толерантности к углеводам. Дефицит сахарозы/изомальтозы глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью Валидол с глюкозой назначают лишь в том случае если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает возможное отрицательное влияние препарате на плод и грудного ребенка.

Побочные действия

При длительном приеме изредка могут наблюдаться легкая тошнота слезотечение головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Передозировка

Симптомы: головная боль тошнота возбужденное состояние снижение артериального давления угнетение центральной нервной системы. Лечение: отмена препарата назначение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении с другими лекарственными средствами угнетающими центральную нервную систему усиливает действие последних. Одновременное применение препарата с нитратами уменьшает головную боль которая возникает при их применении.

Особые указания

Сахарный диабет. В 1 таблетке содержится 188 мг декстрозы моногидрата (глюкозы моногидрата) 544 мг сахара (сахарозы) что соответствует 0067 ХЕ что следует учитывать больным сахарным диабетом. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В связи с возможностью проявления побочного. действия при длительном применении препарата способность управлять транспортным средством или механизмами может снижаться.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.