
Инструкция по применению
Валидол Таблетки сублингвальные 60 мг 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 1

Описание

Таблетки белого цвета. Допускается присутствие желтоватого оттенка и сероватых вкраплений. Таблетки с характерным запахом ментола, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

На одну таблетку: Действующее вещество: Левоментола раствор в ментилизовалерате (валидол) 60 мг Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар белый) 1,15 г Кальция стеарат 0,013 г достаточное количество до получения таблетки массой 1,223 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При применении под язык абсорбируется со слизистой оболочки полости рта, метаболизируется в печени, выводится почками в виде глюкуронидов.

Показания

Функциональная кардиалгия, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Способ применения и дозы

Валидол назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного растворения. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день. Кратность и продолжительность приема Валидола определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или когда у отдельных больных в ближайшие 5-10 минут после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет (отсутствуют данные по безопасности и эффективности применения у детей).

Применение при беременности и кормлении грудью

Назначение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны тошнота, слезотечение, головокружение. При отмене препарата эти побочные эффекты обычно проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек).

Передозировка

Симптомы: головная боль, тошнота, возбужденное состояние, нарушение деятельности сердца, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с лекарственными препаратами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременное применение Валидола с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием алкоголя. С осторожностью применять пациентам с сахарным диабетом (препарат содержит сахарозу). Количество сахарозы в 1 таблетке соответствует 0,09 ХЕ (хлебных единиц). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При приеме препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.