Инструкция по применению
Валидол таблетки подъязычные 60 мг 16 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 16
Дозировка действующего вещества: 60 мг

Описание

Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета с серыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические с фаской и риской, с характерным запахом ментола.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

На 1 таблетку: Действующее вещество: левоментола раствор в ментилизовалерате (валидол) - 60,0 мг. Вспомогательные вещества: сахароза - 963,0 мг, декстроза моногидрат - 188,0 мг, кальция стеарат - 12,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта метаболизируется в печени, выводится с мочой в виде глюкуронидов. Декстрозы моногидрат полностью усваивается организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания

Функциональная кардиалгия неврозы синдром "укачивания" (тошнота рвота при морской и воздушной болезни).

Способ применения и дозы

Препарат назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 минут после приема препарата необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата дефицит сахаразы /изомальтазы непереносимость фруктозы глюкозо-галактозная мальабсорбция возраст до 18 лет (отсутствуют данные по эффективности и безопасности применения препарата у детей).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны тошнота слезотечение головокружение. При отмене препарата эти побочные эффекты обычно проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь зуд ангионевротический отек). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота головная боль резкое снижение артериального давления угнетение центральной нервной системы нарушение сердечной деятельности состояние возбуждения. Лечение: отмена препарата симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с лекарственными средствами угнетающими центральную нервную систему усиливает действие последних. Одновременный прием с нитратами способствует уменьшению головной боли возникающей при их применении.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием алкоголя. С осторожностью применять пациентам с сахарным диабетом (препарат содержит сахарозу). Количество углеводов в 1 таблетке соответствует 0096 ХЕ (хлебных единиц). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами работа диспетчера оператора).

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.