Инструкция по применению
Валидол Таблетки сублингвальные 60 мг 8 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 8
Дозировка действующего вещества: 60 мг

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, круглой формы, плоскоцилиндрические, с фаской, с риской и гравировкой "Д" на одной стороне.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Состав на одну таблетку: активное вещество: левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) 0,060 г вспомогательные вещества: сахароза (сахар) 1,157 г, кальция стеарат 0,006 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме под язык терапевтический эффект наступает, в среднем, через 5 минут, при этом до 70% препарата высвобождается в течение 3 минут.

Показания

Функциональные кардиалгии, синдром «укачивания» (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни).

Способ применения и дозы

Препарат назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема препарата определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 минут после приема препарата необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахарозыизомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозогалактозная мальабсорбция (т.к. препарат содержит сахарозу).

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью Валидол назначают лишь в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает возможное отрицательное влияние препарата на плод и грудного ребенка.

Побочные действия

При длительном приеме валидола могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно

Передозировка

Головная боль, тошнота, возбужденное состояние, снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы. В случае передозировки необходимо отменить препарат и назначить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении с другими лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременное применение препарата с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Особые указания

Сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортными средствами, механизмами В связи с возможностью проявления побочного действия при длительном применении препарата способность управлять транспортным средством или механизмами может снижаться.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.