Инструкция по применению
Валокордин Капли для приема внутрь 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+Мятное масло+Хмелевое масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0

Описание

Валокордин капли - это лекарственное средство, используемое для лечения различных неврологических расстройств. Препарат содержит комбинацию натуральных компонентов, включая этиловый спирт и настойки мяты перечной и других трав. Валокордин капли обладают успокаивающим действием, снижают напряжение и беспокойство, улучшают сон. Лекарство используется для лечения различных заболеваний, связанных с нарушением нервной системы, таких как неврозы, бессонница, сердечная недостаточность другие. Дозировка и режим приема препарата определяются врачом-неврологом.

Действующее вещество

Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+Мятное масло+Хмелевое масло

Состав

Действующее вещество: Фенобарбитал - 18,40 мг ,Этилбромизовалерианат - 18,40 мг , Мятное масло - 1,29 мг ,Хмелевое масло - 0,18 мгВспомогательные вещества: Этанол 96 % - 469,75 мг , Вода очищенная – 411,97 мгКонцентрация действующего вещества (мг): 38,27 мг

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (в том числе кардиалгия, синусовая тахикардия);неврозы, сопровождающиеся раздражительностью, беспокойством, страхом;бессонница (затруднение засыпания); состояния возбуждения, сопровождающиеся выраженными вегетативными реакциями.

Способ применения и дозы

Валокордин принимают внутрь, до еды, с небольшим количеством жидкости. Дозировка устанавливается индивидуально. Взрослым назначают обычно по 15-20 капель 3 раза в день. При нарушенном засыпании дозу можно увеличить до 30 капель. Детям назначают из расчета 1 капля на год жизни ребенка и в зависимости от клинической картины заболевания. Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; выраженные нарушения функции почек и/или печени; беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: беременность, период лактации.

Побочные действия

Валокордин, как правило, хорошо переносится даже при длительном применении. В отдельных случаях, в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение. При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений. При проявлении каких-либо побочных (необычных) эффектов, не отраженных в инструкции, необходимо сообщить о них лечащему врачу.

Передозировка

Передозировка препарата не описана.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте