Инструкция по применению
Валокордин капли 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+Мятное масло+Хмелевое масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Действующее вещество

Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+Мятное масло+Хмелевое масло

Состав

Состав 1 мл препарата содержит: Активные вещества: фенобарбитал - 18,40 мг, этилбромизовалерианат - 18,40 мг. Вспомогательные вещества: мятное масло - 1,29 мг, хмелевое масло - 0,18 мг, этанол 96 % - 469,75 мг, вода очищенная – 411,97 мг.

Форма выпуска

Капли

Показания

Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (в том числе кардиалгия, синусовая тахикардия). Неврозы, сопровождающиеся раздражительностью, беспокойством, страхом. Бессонница (затруднение засыпания). Состояния возбуждения, сопровождающиеся выраженными вегетативными реакциями.

Способ применения и дозы

ВалокординпринимаютВнутрь, до еды, с небольшим количеством жидкости. Доза устанавливается индивидуально. Взрослым назначают обычно по 15-20 капель 3 раза в день. При нарушенном засыпании дозу можно увеличить до 30 капель. Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Выраженные нарушения функции почек и/или печени. Беременность.Период лактации. Детский возраст до 18 лет. С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга т.к. препарат содержит этанол.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: беременность, период лактации.

Побочные действия

Валокордин, как правило, хорошо переносится даже при длительном применении.В отдельных случаях в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение.При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом,проявлениями которого бывают депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагическийдиатез, нарушение координации движений.Редко при повышенной чувствительности могут возникнуть кожные реакции.При проявлении каких-либо побочных (необычных) эффектов, не отраженных в инструкции, необходимосообщить о них лечащему врачу.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении