Инструкция по применению
Валокормид Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Ярославская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+Мятное масло+Хмелевое масло
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, с запахом валерианы и ментола.

Действующее вещество

Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+Мятное масло+Хмелевое масло

Состав

Действующие вещества: Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка 10 мл Ландыша травы настойка 10 мл Красавки листьев настойка 5 мл Натрия бромид 4 г Левоментол 0,25 г Вспомогательное вещество: Вода очищенная до 30 мл

Форма выпуска

Капли

Показания

В качестве успокаивающего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы.

Способ применения и дозы

Внутрь по 10-20 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды 2-3 раза в день до еды. Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, выраженный кардиосклероз, эндокардит, миокардит, печеночная и/или почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, закрытоугольная глаукома.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Тошнота, рвота, диарея, изжога, аритмии, мышечная слабость, головная боль, парез аккомодации, возможны аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: явления бромизма - ринит, кашель, конъюнктивит, вялость, снижение памяти, кожная сыпь (acne bromica), апатия, сонливость, гастроэнтерит, нарушение координации движений. Лечение: прекращение приема препарата, назначение больших количеств (при отсутствии противопоказаний) натрия хлорида - 10-20 г в сутки (ускоряет выведение брома), обильное питье (3-5 л в сутки), назначение диуретиков.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата "Валокормид" проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Максимальная разовая доза препарата (20 капель) содержит 0,14 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата (60 капель) - 0,42 г абсолютного этилового спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.