
Инструкция по применению
Валосердин Капли для приема внутрь 15 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 г+2 г

Описание

Валосердин капли - комбинированный препарат, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами компонентов, входящих в его состав. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектами. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступление естественного сна.

Действующее вещество

Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат

Состав

фенобарбитал 2 гэтилбромизовалерианат (этиловый эфир #-бромизовалериановой кислоты) 2 гВспомогательные вещества: масло мяты перечной - 0.14 г, масло испанское хмелевое (масло душицы) - 0.02 г, этанол 95% - 52.8 г, вода очищенная - 43.04 г.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Показания

— в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при:- функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы.- при неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью. - нарушенном засыпании.- тахикардии.- состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями.— в качестве спазмолитического средства при спазмах кишечника.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, до еды, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды.Взрослым назначают обычно по 15-20 капель 3 раза/сут. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 40-50 капель.Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.При необходимости назначения препарата в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении препарата Валосердин® с седативными средствами – усиление эффекта.Одновременное применение с нейролептиками и транквилизаторами усиливает, а со стимуляторами ЦНС – ослабляет действие каждого из компонентов препарата.Этанол усиливает эффекты Валосердина и может повышать его токсичность.Наличие в составе фенобарбитала может индуцировать ферменты печени, и это делает нежелательным одновременное применение с препаратами, которые метаболизируются в печени, поскольку их концентрация, а соответственно эффективность будет снижаться в результате более ускоренного метаболизма (непрямые антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды и другие). Фенобарбитал ослабляет действие производных кумарина, ГКС, гризеофульвина, контрацептивных средств для приема внутрь.Валосердин® может повышать токсичность метотрексата.

Условия хранения

При комнатной температуре. Беречь от детей