
Инструкция по применению
Валосердин Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 г+2 г
Срок годности: 36

Действующее вещество

Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат

Состав

100 мл содержит:масло душицы обыкновенной 20 мг, масло мяты перечной 140 мг, фенобарбитал 2 г, этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты 2 г.

Форма выпуска

Капли

Показания

Валосердин назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при следующих заболеваниях и состояниях:функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы.Неврозоподобные состояния, сопровождающиеся повышенной раздражительностью.Нарушенное засыпание.Тахикардия.Состояние возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями.Спазмы кишечника (в качестве спазмолитического средства).

Способ применения и дозы

Внутрь, до еды, предварительно растворив в небольшом количестве (30–50 мл) воды. Взрослым назначают обычно по 15–20 капель 3 раза в день. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 40–50 капель. Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Выраженные нарушения функции почек и/или печени. Порфирия. Беременность. Период грудного вскармливания. Возраст до 18 лет. В связи с содержанием абсолютного этилового спирта более 3 г в суточной дозе валосердин противопоказан пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, черепно-мозговой травмой и заболеваниями головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказания: беременность; период лактации.

Побочные действия

Валосердин, как правило, хорошо переносится даже при длительном применении. В отдельных случаях в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение. При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом, характеризующегося следующими проявлениями депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений.При проявлении каких-либо побочных (необычных) эффектов, не отраженных в описании, необходимо сообщить о них лечащему врачу.

Передозировка

Симптомы: при легкой и среднетяжелой интоксикации - сонливость, головокружение, психомоторные нарушения; в тяжелых случаях - снижение АД, нарушение дыхания, тахикардия, коллапс, снижение периферических рефлексов, кома. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с седативными средствами - усиление эффекта. Может повышать токсичность метотрексата. Одновременное применение с нейролептиками и анксиолитиками усиливает, а со стимуляторами ЦНС - ослабляет действие каждого из компонентов препарата. Этанол усиливает эффекты препарата и может повышать его токсичность. Фенобарбитал снижает антибактериальную активность антибиотиков и сульфаниламидов, противогрибковое действие гризеофульвина (снижает всасывание), эффективность непрямых антикоагулянтов, ГКС, доксициклина, эстрогенов и других лекарственных средств, метаболизирующихся в печени по пути окисления (ускоряет их разрушение).

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении