Инструкция по применению
Валосомнин Капсулы 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Твердые желатиновые капсулы № 2, корпус и крышечка красновато-коричневого цвета. Содержимое капсул: порошок или спрессованная масса коричневого цвета с вкраплениями более темного и более светлого цвета с характерным запахом. Характеристика препарата:Препарат обладает успокаивающим и спазмолитическим действием. Экстракт корневищ с корнями валерианы оказывает успокаивающее действие. Экстракт листьев мелиссы – успокаивающее и спазмолитическое, экстракт листьев мяты перечной спазмолитическое и умеренное успокаивающее действие.

Состав

Состав на 1 капсулу: Активные компоненты: валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт сухой ((4-7): 1) (соответствует нативному экстракту 87,50 мг)- 125,00 мг, мелиссы лекарственной листьев экстракт сухой ((3-6): 1) (соответствует нативному экстракту 17,50 мг)- 25,00 мг, мяты перечной листьев экстракт сухой ((3-6): 1) (соответствует нативному экстракту 17,50 мг)- 25,00 мг, Вспомогательные вещества: магния оксид- 6,00 мг, лактозы моногидрат- 85,50 мг, тальк- 8,10 мг, кремния диоксид коллоидный- 3,20 мг, магния стеарат- 2,20 мг, Капсула твердая желатиновая №2: титана диоксид (Е171)- 1%, краситель железа оксид красный (Е172)- 0,85%, краситель железа оксид желтый (Е172)- 0,25%, желатин- до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Бессонница (трудности при засыпании), связанная с повышенной нервной возбудимостью.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая капсулы небольшим количеством воды, независимо от приема пищи. При бессоннице взрослым и детям старше 12 лет следует принимать по 1-2 капсулы за 1 час перед сном. Не следует принимать препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев. Курс лечения составляет 2-4 недели. Для увеличения продолжительности курса лечения необходимо проконсультироваться с врачом. При прекращении лечения синдрома отмены не возникает. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, артериальная гипотензия, холангит, желчекаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не изучено. Назначение препарата в период беременности (особенно в течение первого триместра) и грудного вскармливания возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении- запор. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметши любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (примерно 42 капсулы препарата ВАЛОСОМНИН) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, дрожание рук, расширение зрачков, которые могут исчезнуть самостоятельно в течение 24 часов. При признаках передозировки целесообразно провести промывание желудка и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (ЦНС), гипотензивных препаратов (в частности, центрального действия), обезболивающих средств, что требует коррекции доз.

Особые указания

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов. При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата, следует сообщить об этом лечащему врачу. Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.