Инструкция по применению
Валусал гель 2,5% 50г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Эстония
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кетопрофен
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2.5%
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Кетопрофен

Состав

1 г мази содержит: активные вещества: диметилсульфоксид 50 мг, камфора рацемическая 30 мг, скипидар живичный 30 мг, бензилникотинат 20 мг, нонивамид 2 мг, вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А) – 97 мг, натрия цетилстеарилсульфат – 38 мг, полисорбат-80 – 20 мг, бронопол – 1 мг, вода очищенная – до 1 г.

Форма выпуска

Гель

Показания

Заболевания опорно-двигательного аппарата (суставный синдром при обострении подагры, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит, воспалительное поражение связок, сухожилий, люмбаго, бурсит, ишиас, псориатический артрит). Травмы опорно-двигательного аппарата (в том числе спортивные), посттравматическое воспаление мягких тканей. Мышечные боли ревматического и неревматического происхождения.

Способ применения и дозы

Валусал применяют наружно. Взрослые и подростки старше 15 лет: гель наносят, слегка втирая, тонким слоем на кожу над областью поражения 1-2 раза в сутки. Кожа на болезненном участке должна быть без поражений. Количество наносимого геля зависит от размера болезненного участка тела. Суточная доза не должна превышать 15 г (7,5 г соответствует 14 см геля). Кожу над областью поражения нельзя покрывать бинтом. Применяйте гель короткими курсами лечения. Курс лечения индивидуален (1-10 дней) и зависит от характера болезни и степени тяжести. Не превышайте рекомендуемую дозу, не посоветовавшись с врачом. Гель предназначен только для наружного применения! Не проглатывать! Если Вы забыли применить очередную дозу геля, примените ее немедленно. Но если приближается время применения следующей дозы, пропустите забытую дозу и продолжайте применение в соответствии с рекомендациями. Не применяйте двойную дозу вместо забытой дозы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к кетопрофену или любым другим компонентам Валусала, а также повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП (указания в анамнезе на бронхоспазм, крапивницу, ринит, вызванные приемом ацетилсалициловой кислоты). Мокнущие дерматозы, экзема, инфицированные ссадины и раны в месте предполагаемого нанесения. детям и подросткам (до 15-ти лет). Беременность III триместр, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

В первые 6 месяцев беременности препарат применяют только после тщательной оценки соотношения ожидаемая польза для матери / потенциальный риск для плода. Валусал нельзя применять в последние три месяца беременности. Во время кормления грудью не рекомендуется применять Валусал

Побочные действия

Местные реакции: аллергический дерматит, гиперемия кожи, фотодерматит, кожная экзантема, буллезный дерматит, пурпура, экзема. Системные реакции: крапивница, отеки, генерализованная кожная сыпь, фотосенсибилизация, стоматит. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение Валусала и обратиться к врачу. Передозировка: низкая системная абсорбция активного компонента препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной. При случайном проглатывании больших количеств геля (более 20 г) возможно появление системных нежелательных реакций, характерных для НПВП. В таких случаях необходимо промывание желудка и прием активированного угля.

Передозировка

При наружном применении биодоступность кетопрофена низкая, поэтому возможность передозировки маловероятна. При неправильном применении или случайной передозировке могут возникнуть системные побочные действия. Лечение передозировки симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При наружном применении биодоступность кетопрофена незначительная, поэтому возможность взаимодействия с другими лекарственными препаратами маловероятна.

Особые указания

Валусал предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания геля на слизистую оболочку глаз, открытые раны и воспаленную кожу. Не применять с окклюзионными (воздухонепроницаемыми) повязками. Во избежание светочувствительности в период лечения, а также по прошествии двух недель после последнего применения препарата желательно избегать попадания солнечных лучей на участки кожи, подвергшиеся нанесению препарата (в том числе не посещать солярий).

Условия хранения

Не допускать замерзания