Инструкция по применению
Вазелиновое Масло 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парафин жидкий
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0



Описание

Бесцветная прозрачная маслянистая нефлуоресцирующая жидкость без запаха.

Действующее вещество

Парафин жидкий

Состав

Действующее вещество: парафин жидкий (вазелиновое масло).

Форма выпуска

Масло

Фармакокинетика

При приеме внутрь не всасывается.

Показания

Запор.

Способ применения и дозы

Внутрь по 15-30 мл (1-2 столовые ложки) в день, спустя 2 часа после приёма пищи. Курс лечения не более 5 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Острые воспалительные процессы в брюшной полости, кишечное кровотечение, кишечная непроходимость, лихорадочный синдром, беременность, повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. В период грудного вскармливания возможен по рекомендации врача.

Побочные действия

При длительном применении - нарушение процесса пищеварения, атония кишечника, гиповитаминоз витаминов А, Е, К. При появлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Не следует назначать препарат беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. Нельзя применять в качестве слабительного средства при отравлении жирорастворимыми веществами (фосфором, бензолом и др.) и при лечении глистной инвазии экстрактом мужского папоротника. Следует учитывать, что при приеме внутрь вазелиновое масло может пройти через анальный сфинктер и загрязнить белье. При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5-7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении