Инструкция по применению
Вазобрал Таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: КЬЕЗИ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дигидроэргокриптин+Кофеин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 4 мг+40 мг
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Дигидроэргокриптин+Кофеин

Состав

Действующее вещество: Альфа-дигидроэргокриптин (Alpha-dihydroergocryptine), Кофеин (Caffeine). Концентрация действующего вещества (мг): Альфа-дигидроэргокриптин - 4 мг, Кофеин - 40 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При пероральном приеме всасывание дигидроэргокриптина ускоряется в присутствии кофеина (время достижения максимальной концентрации 0,5 часа). Максимальная концентрация после приема внутрь 8 мг дигидроэргокриптина составляет 227 пкг/мл, а период полувыведения из плазмы - менее 2 часов.

Показания

Цереброваскулярная недостаточность (в т. ч. вследствие церебрального атеросклероза), последствия нарушения мозгового кровообращения, вестибулярные и лабиринтные нарушения (головокружение, шум в ушах, гипоакузия) ишемического генеза, болезнь Меньера.

Способ применения и дозы

Внутрь (во время еды, с небольшим количеством жидкости) по 12-1 таблетке 2 раза в день. Продолжительность курса лечения 2-3 месяца, при необходимости курсы лечения можно проводить 1-2 раза в год.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, признаки наличия пороков клапанов сердца, выявленные при эхокардиографии, проведенной до начала применения препарата.

Побочные действия

Тошнота, гастралгия, диспепсия, головокружение, возбуждение, головная боль, аллергические реакции, тахикардия, гипотензия.

Передозировка

Симптомы: может вызвать рвоту. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном назначении Вазобрала и гипотензивных препаратов возможно развитие артериальной гипотензии. Кофеин ослабляет действие снотворных средств.

Особые указания

Вазобрал оказывает сосудорасширяющее действие, не влияя на системное артериальное давление. Назначение Вазобрала больным с артериальной гипертензией не исключает необходимость применение антигипертензивных средств. Содержащийся в препарате кофеин может вызвать нарушение сна, тахикардию.

Условия хранения

Беречь от детей