Инструкция по применению
Велсон Таблетки 3 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Петровакс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мелатонин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 3 мг



Описание

Адаптогенный препарат

Действующее вещество

Мелатонин

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро и полностью абсорбируется из ЖКТ. Легко проникает через гистогематические барьеры (в т.ч. через ГЭБ). Т1/2 короткий.

Показания

Расстройство нормального циркадного ритма (десинхроноз) вследствие быстрого перемещения между часовыми поясами Земли, проявляющееся повышенной утомляемостью, нарушения сна (в т.ч. у пациентов пожилого возраста), депрессивные состояния, имеющие сезонный характер.

Способ применения и дозы

Индивидуальный. Принимают внутрь в дозе 1.5-3 мг 1 раз/сут за 30-40 мин до сна.

Противопоказания

Аллергические заболевания, лимфома, аутоиммунные заболевания, лимфогранулематоз, лейкоз, миелома, эпилепсия, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, беременность, лактация.

Применение при беременности и кормлении грудью

мелатонин 3 мг Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат - 64.67 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 25 мг, повидон К25 - 3.33 мг, кроскармеллоза натрия - 2 мг, тальк - 1 мг, кремния диоксид коллоидный - 0.5 мг, кальция стеарат - 0.5 мг. Состав оболочки: опадрай белый (03А280002) - 3 мг (гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 40%, целлюлоза микрокристаллическая - 32%, титана диоксид - 20%, макрогол (полиэтиленгликоль) - 8%).

Передозировка

С осторожностью применяют у пациентов, деятельность которых связана с необходимостью повышенной концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими препаратами

Со стороны ЦНС: головная боль, утренняя сонливость в первую неделю терапии.Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.Прочие: аллергические реакции, отеки.

Особые указания

Противопоказан при беременности и в период лактации.Не рекомендуется применять у женщин, желающих забеременеть, в связи с некоторым контрацептивным действием мелатонина.

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре