Инструкция по применению
Венарус таблетки 900 мг + 100 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алиум
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гесперидин+Диосмин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 900 мг + 100 мг

Описание

Венарус® оказывает ангиопротекторное и венотонизирующее действие. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает венозный застой; снижает проницаемость, ломкость капилляров и увеличивает их резистентность; улучшает микроциркуляцию и лимфоотток. При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы. Оптимальное соотношение «доза-эффект» наблюдается при приеме 1000 мг в день.   Форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой оранжево-розового цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы со скругленными концами, с риской. На поперечном разрезе ядро от серовато-желтого до коричневато-серого цвета.

Действующее вещество

Гесперидин+Диосмин

Состав

1 таблетка содержит:действующие вещества:гесперидин микронизированный (в пересчете на 100 % вещество) 100 мг, диосмин микронизированный (в пересчете на 100 % вещество) 900 мг,вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 124 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмала гликолят) 54 мг, желатин 62 мг, тальк 12 мг, магния стеарат 8 мг,вспомогательные вещества для оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 41,4 мг, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000) 6,76 мг, натрия лаурилсульфат 0,2 мг, магния стеарат 2,48 мг, титана диоксид 7,88 мг, железа оксид красный 0,6 мг, железа оксид желтый 0,68 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Основное выделение препарата происходит с калом. С мочой в среднем выводится около 14% принятого количества препарата. T1/2 — 11 ч. Препарат подвергается активному метаболизму, что подтверждается присутствием феноловых кислот в моче.

Показания

Венарус® показан для терапии симптомов хронических заболеваний вен (устранения и облегчения симптомов). Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности: * судороги нижних конечностей, * ощущение тяжести и распирания в ногах, * боль, * «усталость» ног. Терапия проявлений венозно-лимфатической недостаточности: * отеки нижних конечностей, * трофические изменения кожи и подкожной клетчатки, * венозные трофические язвы. Симптоматическая терапия острого и хронического геморроя.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. Не рекомендуется прием препарата женщинам в период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Эксперименты на животных не выявили тератогенных эффектов. До настоящего времени не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата беременными женщинами. Из-за отсутствия данных относительно экскреции препарата в грудное молоко, кормящим женщинам не рекомендуется прием препарата.

Побочные действия

Частота развития нежелательных реакций представлена следующим образом: очень часто (≥1/10 случаев), часто (≥1/100 и < 1/10 случаев), нечасто (≥1/1000 и < 1 /100 случаев), редко (≥1/10000 и < 1/1000 случаев) и очень редко (< 1/10000 случаев). Нежелательные реакции, частоту развития которых не представляется возможным оценить по доступным данным, имеют обозначение «частота неизвестна».

Передозировка

Случаев передозировки не описано. При передозировке препарата следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечалось. Следует информировать лечащего врача обо всех принимаемых лекарственных препаратах.

Особые указания

При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать сроки, указанные в разделе «Способ применения и дозы». В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса терапии, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть применяемую терапию. При наличии нарушений венозного кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием терапии со здоровым (сбалансированным) образом жизни: желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также снижение избыточной массы тела. Пешие прогулки и в некоторых случаях, ношение специальных чулок, способствует улучшению циркуляции крови. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами и заниматься другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания. Не влияет.

Условия хранения

При температуре не выше 25 С. ### Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.