
Инструкция по применению
Венолайф Гель для наружного применения 100 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гепарин натрия+Декспантенол+Троксерутин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Прозрачный или почти прозрачный гель светло-желтого цвета со специфическим запахом.

Действующее вещество

Гепарин натрия+Декспантенол+Троксерутин

Состав

100 г геля содержат: Активные вещества: троксерутин в пересчете на 100 % вещество - 2 г (2%), гепарин натрия в пересчете на сухое вещество - 0,25 г (30000МЕ) (0,25%), декспантенол в пересчете на 100 % вещество - 5 г (5%). Вспомогательные вещества: фенилэтанол 1 г, пропиленгликоль 10 г, карбомер 940 или 980 0,8 г, трометамол 0,4 г, вода очищенная до 100 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При местном применении активные вещества быстро абсорбируются кожей. Гепарин накапливается в верхних слоях и активно связывается с протеинами кожи, декспантенол проникает во все слои кожи и превращается в пантотеновую кислоту, троксерутин через 30 минут обнаруживается в дерме, а через 2-5 часов в подкожной жировой клетчатке.

Показания

Отечно-болевой синдром и микроциркуляторно-трофические нарушения, обусловленные венозной недостаточностью нижних конечностей (варикозное расширение вен, острый и хронический тромбофлебит, посттромбофлебитический синдром, хронический лимфостаз) травмы мягких тканей (гематомы, вывихи, растяжения) для ускорения грануляции и эпителизации трофических язв в фазе регенерации (при отсутствии выраженной экссудации).

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят тонким слоем на пораженную область 2-3 раза в сутки, равномерно распределяя по поверхности кожи легкими втирающими движениями до полного впитывания. Курс лечения составляет 2-3 недели. Необходимость дальнейшего лечения определяет лечащий врач, исходя из тяжести патологического процесса и результатов клинических анализов. При рецидиве заболевания курс лечения можно проводить 2-3 раза в год. При трофических язвах со слабой экссудацией перед применением препарата раневую поверхность очищают от экссудата и некротических тканей, при необходимости промывают раствором перекиси водорода 3 %, нитрофурала 1:5000 или хлоргексидина биглюконата 0,05 % и просушивают. Гель наносят равномерным тонким слоем таким образом, чтобы вся пораженная поверхность была покрыта препаратом, и накладывают стерильную марлевую повязку. Смену повязок проводят 1 раз в сутки. При открытом способе лечения препарат наносят 1-2 раза в день. Продолжительность лечения определяется динамикой эпителизации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата открытые инфицированные раны или раны с обильной экссудацией в месте нанесения детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата Венолайф® при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможны местные проявления аллергических реакций (кожная сыпь, зуд).

Передозировка

Передозировка маловероятна в связи с малой системной абсорбцией компонентов геля.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Венолайф® не предназначен для применения в офтальмологии, для интравагинального и ректального введения.

Условия хранения

Беречь от детей