Инструкция по применению
Венолек таблетки покрытые оболочкой 500 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КАНОНФАРМА ПРОДАКШН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диосмин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Диосмин

Состав

Одна таблетка содержит: активное вещество - диосмин 500 мг.Вспомогательные вещества: гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), кальция гидрофосфат дигидрат, магния стеарат, карбоксиметилкрахмал натрия (натрий гликолат крахмала), целлюлоза микрокристаллическая, селекоут AQ-01812: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), макрогол (полиэтиленгликоль 400), макрогол (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид, железа оксид желтый, хинолиновый желтый.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Период полувыведения составляет 11ч. Выводится кишечником, почками.

Показания

Симптоматическая терапия венозной недостаточности нижних конечностей: ощущение тяжести и боль в ногах. Симптоматическая терапия острого геморроя.

Способ применения и дозы

Внутрь во время еды. При венозной недостаточности - по 2 таблетки в сутки (в полдень и вечером). При остром геморрое - 6 таблеток в сутки (по 3 таблетки 2 раза) в течение первых 4 дней, затем 4 таблетки в сутки (по 2 таблетки 2 раза) в течение 3 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность, период лактации. Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применение препарата возможно. Экспериментальные и клинические исследования не показали эмбриотоксического, мутагенного и тератогенного действия.

Побочные действия

Диарея, диспепсия, тошнота, рвота; головокружение, головная боль, недомогание; аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница).

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечалось.

Особые указания

При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет специфического лечения других симптомов геморроя. В случае, если короткая терапия не дает положительного эффекта, необходимо провести проктологическое исследование и пересмотреть применяемую терапию.

Условия хранения

В сухом месте