Инструкция по применению
Венорутон Капсулы 300 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Испания
Производитель: Novartis Pharma
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Рутозид
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 300 мг
Срок годности: 2



Описание

Препарат с венотонизирующим и ангиопротекторным действием

Действующее вещество

Рутозид

Состав

Гидроксиэтилрутозиды 300 мг. Вспомогательные вещества: макрогол 6000 - 9 мг, пустая твердая желатиновая капсула (желатин - 63.0097 мг, вода - 11.02 мг, титана диоксид - около 1.5 мг, краситель железа оксид желтый - 0.47 мг). Состав черных чернил: шеллак в этаноле, краситель железа оксид черный, н-бутанол, пропиленгликоль, изопропанол, аммиак водный.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 2-9 ч. В течение 40 ч концентрация препарата остается определяемой, её снижение происходит биэкспоненциально. Связывание с белками плазмы составляет 27-29%. Гидроксиэтилрутозиды и их глюкуронированные метаболиты выводятся преимущественно с желчью, 3-6 % выводятся почками за 48 ч. Период полувыведения гидроксиэтилрутозидов может варьировать от 13,5 до 25,7 ч, однако у каждого человека его величина относительно постоянна.

Показания

Хроническая венозная недостаточность, постфлебитический синдром трофические нарушения при варикозной болезни и трофические язвы с такими симптомами как: отеки, боль, судороги, парестезия и чувство тяжести в ногах. - в качестве вспомогательного лечения при лимфостазе, после склеротерапии вен и удаления варикозных узлов, - геморрой (боль, экссудация, зуд и кровотечение), - в качестве вспомогательного лечения ретинопатии у больных сахарным диабетом, артериальной гипертензией и атеросклерозом.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Капсулы проглатывают целиком, запивая водой. При хронической венозной недостаточности, постфлебитическом синдроме, трофических нарушениях при варикозной болезни и трофических язвах: на начальном этапе лечения (в течение первых 2 недель) принимают по 1 капсуле Венорутон® 2-3 раза в сутки (не более 3 капсул в сутки). Далее лечение либо продолжают в течение 2-3 месяцев в той же дозе в качестве поддерживающей терапии, либо прекращают. Минимальная поддерживающая доза составляет по 1 капсуле 2 раза в сутки. При этом достигнутый терапевтический эффект сохраняется не менее 4 недель. Минимальный курс лечения, в течение которого обычно развивается эффект, составляет 2 недели. Для поддержания результата необходимо проводить 2 курса лечения в год. При лимфостазе (наряду с бинтованием эластичными бинтами), также после склеротерапии вен и удаления, варикозных узлов: рекомендуемая доза составляет 10 капсул в сутки: по 3 капсулы - утром и вечером и 4 капсулы на ночь в течение до 6 месяцев. Для устранения симптомов геморроя: рекомендуемая доза составляет по 1 капсуле 2-3 раза в сутки (не более 3 капсул в сутки) до устранения симптомов, обычно в течение 28 дней. При диабетической ретинопатии, артериальной гипертензии и атеросклерозе (в качестве вспомогательной терапии): по 2-3 капсулы 2-3 раза в сутки, не более 3000 мг в сутки, на протяжении 2 месяцев.

Противопоказания

Гиперчувствительность к рутозидам или к другим компонентам препарата. Беременность (I триместр), детский возраст до 18 лет. С осторожностью: При печеночной, почечной или сердечной недостаточностях. Беременность и лактация: В экспериментальных исследованиях не было отмечено тератогенных или других нежелательных воздействии на плод. С грудным молоком выделяются лишь незначительные количества препарата, что не имеет клинической значимости. Назначение Венорутон® внутрь при беременности со II триместра, а также во время лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.

Применение при беременности и кормлении грудью

В ходе клинических исследований изучалось применение Венорутона при беременности, однако, его применение в I триместре специально не изучалось. Применение в I триместре беременности противопоказано.В исследованиях, проведенных на животных, не было отмечено тератогенного и другого нежелательного воздействия препарата на плод. Назначать Венорутон® внутрь рекомендуется, только начиная со II триместра беременности, когда ожидаемая польза для матери от его применения превышает возможный риск для плода.

Побочные действия

Расстройства со стороны иммунной системы: очень редко (1/10 000, 1/10 000, <1 /1000): кожная сыпь, зуд, крапивница. Общие расстройства: очень редко (<1/10 000): слабость.

Взаимодействие с другими препаратами

Не сообщалось о клинически значимых взаимодействиях с другими лекарственнными средствами. Действие может усиливаться при одновременном приеме аскорбиновой кислоты.

Особые указания

Если в период применения препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует проконсультироваться с врачом. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами: Не сообщалось о влиянии препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.