Инструкция по применению
Venoteks Колготки компрессионные 2 класс размер L черные арт. 33

Характеристики



Форма выпуска: Колготки
Страна: Германия
Производитель: ГМБХ Рехард технологии
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Антиварикозные колготы арт. 33 - это трикотаж 2 степени компрессии, поддерживающий нормальное состояние вен на ногах при длительной работе на ногах, при наличии сильных отёков, не спадающих после сна, при распирании, онемении, болезненных ощущениях в области вен.Особенности изделия Физиологически распределенная градуированная компрессия: лодыжка 100%, середина икры 80%, колено 50-60%, верхняя треть бедра 20-30%. Параметры компрессии медицинских трикотажных изделий заложены в сложной современной технологии их изготовления. Компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба. Гарантированное сохранение компрессионных свойств в течение 6 месяцев ежедневного использования. Производится из современных, безопасных, гипоаллергенных материалов, обеспечивающих активный воздухо- и влагообмен. LatexFree.

Состав

80% нейлона, 20% эластана.

Форма выпуска

Колготки

Показания

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) с расширенными поверхностными венами. Наличие невоспапенных уплотнений и варикозных узлов на венах. Сильные отеки ног, не проходящие к утру. Множественные сосудистые звездочки или выраженная венозная сетка, занимающая площадь более 1/3 голени или бедра. Острый тромбофлебит. Посттромбофлебитическая болезнь, в том числе у беременных. Отеки ног и любые признаки ХВН на фоне беременности и в послеродовом периоде. Подготовка к оперативному вмешательству на венах нижних конечностей. Состояние после склеротерапии и удаления вен. Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска.Обратите внимание!Применение II класса компрессии трикотажа требует консультации врача.

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения. возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев.Рекомендации по уходу: рекомендована ручная стирка при температуре 30°С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей не тереть и не выжимать изделие после стирки тщательно прополоскать бандаж сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Противопоказания

Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Диабетическая полинейропатия и ангиопатия. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложненные стенозом артерий, тромбозом или тромбоэмболией) (индекс ABPI > 1.2 или индекс ABPI Трофические язвы не венозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит. Местные кожные заболевания ног. Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа. Размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).