Инструкция по применению
Venoteks Колготки компрессионные с открытым носом 3 класс р. S бежевые арт. 307

Характеристики

Форма выпуска: Колготки
Страна: Германия
Производитель: ГМБХ Рехард технологии
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Колготы 3 класса компрессии предназначены для ног с серьёзным нарушением венозного кровообращения: тромбофлебитом, трофическими язвами, послеоперационным состоянием после удаления вен. Назначаются только по рекомендации врача-флеболога.Преимущества колгот Venoteks арт.307 (3 класс компрессии): Физиологически распределенная градуированная компрессия: лодыжка 100%, середина икры 80%, колено 50-60%, верхняя треть бедра 20-30% Параметры компрессии медицинских трикотажных изделий заложены в сложной современной технологии их изготовления Компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба Гарантированное сохранение компрессионных свойств в течение 6 месяцев ежедневного использования Производится из современных, безопасных, гипоаллергенных материалов, обеспечивающих активный воздухо- и влагообмен. LatexFree

Состав

75% нейлон, 25% эластан

Форма выпуска

Колготки

Показания

Выраженная и осложненная хроническая венозная недостаточность (ХВН). Сильные отеки на ногах в сочетании с варикозными узлами и наличием уплотнений по ходу вен. Тромбоз глубоких вен. Хронический тромбофлебит поверхностных вен. Посттромбофлебитическая болезнь. Наличие участков пигментации по ходу вен на голенях или бедрах. Начальные проявления лимфовенозной недостаточности. Трофические язвы в стадии заживления. Наличие артерио-венозных шунтов (синдром Паркс-Вебера). Врожденное недоразвитие клапанов глубоких вен нижних конечностей (синдром Клип-пель-Треноне).Обратите внимание!Применение трикотажа III класса компрессии требует консультации врача.

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения. возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев.Рекомендации по уходу: рекомендована ручная стирка при температуре 30°С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей не тереть и не выжимать изделие после стирки тщательно прополоскать бандаж сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Противопоказания

Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Диабетическая полинейропатия и ангиопатия. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложненные стенозом артерий, тромбозом или тромбоэмболией) (индекс ABPI > 1.2 или индекс ABPI Трофические язвы не венозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит. Местные кожные заболевания ног. Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа. Размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).