Инструкция по применению
Вермокс таблетки 100 мг 6 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Румыния
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мебендазол
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Мебендазол

Состав

Действующее вещество: Мебендазол. Концентрация действующего вещества (мг): 100 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь Вермокс мало абсорбируется. Небольшая часть активного вещества, попадая в кровь, на 90% связывается с белками плазмы и метаболизируется в печени.

Показания

Аскаридоз (заболевание, вызываемое кишечными паразитарными червями аскаридами), энтеробиоз (заболевание, вызываемое кишечными паразитарными червями острицами), анкилостомидоз (заболевание, вызываемое паразитарными червями, приводящее к развитию анемий уменьшению числа эритроцитов в крови) и трихоцефалез (заболевание кишечника, вызываемое паразитарными червями власоглавами), а также гельминтозы смешанной этиологии.

Способ применения и дозы

При энтеробиозе взрослым и детям назначают 100 мг (1 таб.) препарата однократно. Для предупреждения повторной инвазии прием препарата повторяют через 2 и 4 недели в той же дозе. При аскаридозе, анкилостомидозе, трихоцефалезе, смешанных гельминтозах взрослым и детям старше 1 года назначают по 100 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 3 дней. При тениозе и стронгилоидозе взрослым рекомендуется принимать по 200 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней. Детям назначают по 100 мг 2 раза в сутки также в течение 3 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, печеночная недостаточность, детский возраст (до 2 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности, особенно в I триместре, Вермокс следует применять с особой осторожностью, сопоставляя потенциальный риск от назначения препарата с ожидаемым терапевтическим эффектом. В период применения препарата следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Головокружение, тошнота, абдоминальные боли. При применении в высоких дозах в течение длительного времени: рвота, диарея, головная боль, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек), повышение активности печеночных трансаминаз, гиперкреатининемия, лейкопения, анемия, эозинофилия, выпадение волос, гематурия, цилиндрурия. Может оказать отрицательное влияние на развитие плода. Передозировка. Симптомы: абдоминальные боли, тошнота, рвота, диарея. При применении в высоких дозах в течение длительного времени: обратимые нарушения функции печени, гепатит, нейтропения. Лечение: необходимо удалить препарат из желудка, вызвав рвоту или сделав промывание желудка, прием активированного угля.

Передозировка

Симптомы: спазмы в брюшной полости, тошнота, рвота, диарея. Лечение: специфического антидота нет. Рекомендуют проводить промывание желудка водным раствором калия перманганата из расчета 20 мг/100 мл воды. Можно применять активированный уголь.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное назначение с циметидином может приводить к усилению эффекта Вермокса за счет ингибирования метаболизма мебендазола в печени и повышения концентрации в плазме

Особые указания

При длительном приеме препарата Вермокс необходимо контролировать картину периферической крови, функцию печени и почек. У пациентов с сахарным диабетом необходимо контролировать концентрацию глюкозы в крови. В течение суток после приема запрещается употребление этанола, жирной пищи, не назначают слабительное. Обязательно периодическое исследование мазков анальной области и кала после окончания лечения: терапия считается эффективной при отсутствии гельминтов или их яиц в течение 7 последующих дней. Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или нарушенным всасыванием глюкозо/галактозы не следует назначать этот препарат. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Пациентам следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с техникой, поскольку во время лечения может возникать головокружение и наблюдаться сонливость.

Условия хранения

В сухом месте