Инструкция по применению
Верошпирон Таблетки 25 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Спиронолактон
Количество в упаковке: 60



Описание

Белые или почти белые плоские, круглые таблетки с фаской, с характерным запахом и с маркировкой VEROSPIRON-” на одной стороне. Характеристика препарата: Препарат Верошпирон® содержит действующее вещество спиронолактон. Спиронолактон является калийсберегающим диуретиком (мочегонное средство) пролонгированного действия, конкурентным антагонистом альдостерона (гормон коры надпочечников).

Действующее вещество

Спиронолактон

Состав

Препарат Верошпирон содержит: Действующим веществом является спиронолактон. Каждая таблетка содержит 25 мг спиронолактона. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, тальк, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Верошпирон показан к применению у взрослых и детей старше 3 лет. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН): Артериальная гипертензия (в составе комбинированной терапии, преимущественно при гипокалиемии). Цирроз печени, сопровождающийся асцитом и/или отеками. <Нефротический синдром, сопровождающийся отеками. Диагностика и лечение первичного гиперальдостеронизма (синдром Конна). Гипокалиемия:

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Лечение отеков при ХСН Начальная доза составляет 100 мг в сутки, при недостаточной эффективности доза препарата может быть постепенно увеличена до максимальной суточной дозы 200 мг. Поддерживающая доза подбирается индивидуально и составляет от 25 до 200 мг в сутки. Лечение тяжелой ХСН При хорошей переносимости лечения доза составляет от 25 до 50 мг в сутки. При плохой переносимости терапии или при развитии гиперкалиемии - от 25 мг в сутки до 25 мг 1 раз в 2 дня. Артериальная гипертензия Суточная доза от 25 мг до 100 мг. Увеличение суточной дозы спиронолактона более 100 мг не приводит к усилению антигипертензивного действия. При других состояниях/заболеваниях (цирроз печени, сопровождающийся асцитом и/или отеками, нефротический синдром, сопровождающийся отеками, при диагностике и лечении первичного гиперальдостеронизма (синдром Конна), гипокалиемии) Ваш врач определит для Вас подходящую дозировку, в зависимости от Вашего состояния, текущего лечения. Суточная доза препарата зависит от основного заболевания и от продолжительности лечения. Пациентам пожилого возраста врач может назначить препарат в более низкой дозе и, при необходимости, может постепенно увеличивать дозу до достижения желаемого эффекта. Применение у детей и подростков Дети старше 3 лет и подростки до 18 лет Начальная доза препарата составляет 1-3 мг/кг массы тела в сутки в 2-4 приема. При проведении поддерживающей терапии или при одновременном применении с другими диуретиками доза препарата Верошпирон должна быть снижена до 1-2 мг/кг массы тела. Дети до 3 лет При применении у детей до 3 лет можно использовать суспензию. Для приготовления суспензии таблетки следует измельчить и смешать с жидкостью или кашицеобразной пищей. Суспензию следует использовать немедленно, сразу после приготовления. Путь и (или) способ введения Внутрь, после еды, 1 или 2 раза в сутки. Прием суточной дозы или первой части суточной дозы препарата рекомендуется утром. Продолжительность терапии Препарат Верошпирон следует принимать так долго, как прописал Вам врач.

Возможно, Вам придется принимать данный препарат длительное время. Если Вы забыли принять препарат Верошпирон Если Вы пропустили дозу, примите ее, как только вспомните, если только не пришло время для следующей дозы. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу, поскольку таким образом Вы подвергнете себя риску передозировки. Продолжайте прием согласно назначению. Если Вы прекратили прием препарата Верошпирон Очень важно постоянно принимать препарат Верошпирон, пока Ваш лечащий врач не отменит назначение. Вы должны продолжать прием препарата, даже если почувствуете улучшение. Если Вы прекратите прием препарата Верошпирон слишком рано, Ваше состояние может ухудшиться. При наличии вопросов по применению препарата Верошпирон обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Верошпирон:

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не принимайте препарат Верошпирон во время беременности. Спиронолактон проникает в грудное молоко. Не принимайте препарат Верошпирон в период грудного вскармливания или прекратите грудное вскармливание на время лечения препаратом Верошпирон.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите прием препарата Верошпирон и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции: Возможно развитие тяжелых нежелательных реакций: Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Верошпирон. Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10): Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000): Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата. Российская Федерация Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Адрес: 109012 г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 Телефон: +7 800 550-99-03 Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru Интернет-сайт: https://www.roszdravnadzor.gov.ru Республика Армения Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна АОЗТ Адрес: 0051 г. Ереван, пр. Комитаса 49/5 Отдел мониторинга безопасности лекарств Телефон: +374 10 20-05-05, +374 96 22-05-05 Электронная почта: vigilance@pharm.am Интернет-сайт: http://www.pharm.am Республика Беларусь Республиканское унитарное предприятие Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Адрес: 220037 г. Минск, пер. Товарищеский 2а Отдел фармаконадзора Телефон: +375 17 242-00-29 Электронная почта: rcpl@rceth.by Интернет-сайт: https://rceth.by Республика Казахстан РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Адрес: 010000 г. Астана, ул. А.Иманова, 13 (4 этаж) Телефон: +7 7172 23-51-35 Электронная почта: pdlc@dari.kz Интернет-сайт: https://www.ndda.kz Кыргызская Республика Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Адрес: 720044 г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25 Телефон: + 996 312 21-92-88 Электронная почта: vigilance@pharm.kg Интернет-сайт: http://www.pharm.kg.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Верошпирон больше, чем следовало Если Вы намеренно или случайно приняли слишком много таблеток, немедленно обратитесь за медицинской помощью к врачу или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. Возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш препарата. В случае передозировки могут развиваться сонливость, помутнение сознания, кожная сыпь, тошнота, рвота, головокружение, диарея, нарушение электролитного баланса (например, избыток калия, недостаток натрия) и кома (у пациентов с тяжелым заболеванием печени). Специфического антидота не существует, лечение симптоматическое. Проводится промывание желудка, симптоматическое лечение обезвоживания, коррекция артериальной гипотензии и восстановление кислотно-щелочного равновесия.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Если Вы принимаете Верошпирон одновременно с перечисленными ниже препаратами, они могут влиять друг на друга: Если Вы принимаете один из вышеперечисленных препаратов, перед приемом препарата Верошпирон проконсультируйтесь с лечащим врачом. Препарат Верошпирон с пищей, напитками и алкоголем Соблюдение богатой калием диеты или употребление калийсодержащих заменителей соли может привести к развитию тяжелой гиперкалиемии. Во время приема препарата Верошпирон запрещается употребление алкоголя.

Особые указания

Одновременное применение препарата Верошпирон с определенными лекарственными средствами, препаратами калия и продуктами, богатыми калием, может привести к тяжелой гиперкалиемии (повышению уровня калия в крови). Симптомы тяжелой гиперкалиемии могут включать мышечные судороги, нарушение сердечного ритма, понос (диарею), тошноту, головокружение или головную боль. Ваш врач может регулярно назначать анализы крови для определения уровня калия, натрия, мочевой кислоты, глюкозы и креатинина, а также контролировать функцию почек. У мужчин может увеличиваться грудная железа (гинекомастия), время от начала лечения спиронолактоном до возможного появления гинекомастии варьирует от 1-2 месяцев до более чем одного года и зависит от дозы препарата. Гинекомастия обычно обратима при отмене препарата. Дети и подростки Препарат следует с осторожностью применять у детей с артериальной гипертензией и легкой почечной недостаточностью в связи с риском развития гиперкалиемии. Препарат Верошпирон не предназначен для применения у детей до 3 лет. Препарат Верошпирон содержит лактозу Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При применении спиронолактона может появиться сонливость и головокружение. В начальном периоде лечения запрещается управление транспортными средствами и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Длительность ограничений устанавливается в индивидуальном порядке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.