Инструкция по применению
Веррукацид Раствор для наружного применения 2 г

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Ретиноиды
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: метакрезол+Фенол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

метакрезол+Фенол

Состав

Действующее вещество: фенол 588 мг, метакрезол 392 мгКонцентрация действующего вещества (мг): 980 мг

Форма выпуска

Раствор

Показания

Обычные нитевидные и подошвенные бородавки, папилломы, остроконечные кондиломы кожи, сухие мозоли, кератомы.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят точно на обрабатываемый участок специальным аппликатором или небольшой тонкой деревянной палочкой, не допуская попадания на соседние участки и слизистые оболочки.Мелкие папилломы (до 2 мм) и нитевидные бородавки: смазывают однократно.Более крупные папилломы и небольшие бородавки (2–3 мм): смазывают 3–4 раза, делая перерывы для подсыхания раствора.Бородавки на кистях и подошвах: обрабатывают 7–10 раз с интервалом 3–4 мин.Кератомы и сухие мозоли: обрабатывают 3–4 раза с интервалом 3–4 мин.Перед удалением бородавок на кистях с плотной ороговевшей поверхностью, подошвенных бородавок, кератом и сухих мозолей их размягчают кератолитической мазью (например салициловой), покрывая смазанный участок компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой и, поверх них, марлевой повязкой. Возможно заклеивание пластырем. Затем повязку или пластырь снимают, кожу распаривают в горячей воде с добавлением мыла и соды в течение 10–15 мин и срезают роговые наслоения маникюрными ножницами или щипцами. Препарат наносят на подсушенную кожу несколько раз с интервалом 3–4 мин для подсыхания.При необходимости многократного нанесения препарата во избежание ожога окружающей кожи целесообразно смазать ее цинковой пастой. Паста удаляется сухим марлевым тампоном после подсыхания последней порции препарата.Остроконечные кондиломы: удаляют в процедурном кабинете (самостоятельно не рекомендуется), нанося препарат на каждый элемент в отдельности 1–2 раза с интервалом 3–4 мин.Повторную обработку при необходимости проводят через 6–8 дней после отпадения корочки. Допускается повторение процедуры 4–5 раз.

Противопоказания

Невусы (в том числе родимые пятна), площадь поражения кожи более 20 см2; высыпания, расположенные на красной кайме губ и слизистых оболочках, детский возраст (до 7 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. В период лактации не рекомендуется удалять образования, расположенные на молочных железах и кистях рук.

Побочные действия

Отек и покраснение века (при обработке очагов вблизи глаз). Проходит самостоятельно.

Передозировка

Не выявлена.

Взаимодействие с другими препаратами

Компоненты препарата легко растворяются в мазевой основе, в связи с чем смазывать какими-либо мазями обработанный Веррукацидом участок кожи не рекомендуется.

Особые указания

Недопустимо бинтование участков, обработанных препаратом, заклеивание их пластырем, смазывание какими-либо мазями и удаление корочки; нельзя повторно наносить препарат раньше сроков, указанных выше. Одежда из синтетических тканей не должна прикасаться к участку кожи, обработанному препаратом.Не рекомендуется наносить Веррукацид на образования, расположенные в кожных складках (паховые складки, анальная область, межпальцевые промежутки и др.) и сильно потеющие участки во избежание ожогов непораженной кожи соприкасающейся поверхности или в результате растекания препарата по влажной коже.Обработанный Веррукацидом участок кожи должен высохнуть на воздухе, его нельзя смазывать какими-либо мазями, мыть водой в первый день после обработки.При правильном применении препарат не оставляет рубцов.Особая аккуратность и осторожность требуется при лечении препаратом детей.

Условия хранения

В сухом месте