Инструкция по применению
Вертигохель Таблетки для рассасывания гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 36



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат при при головокружениях различного происхождения.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Anamirta cocculus (Анамирта коккулюс) D4 210 мг, Conium maculatum (Кониум макулятум) D3 30 мг, Ambra grisea (Амбра гризея) D6 30 мг, Petroleum rectificatum (Петролеум ректификатум) D8 30 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. При острых внезапных приступах головокружений и тошноте сначала по 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2-3 недели. Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом по 1 таблетке каждые 15 минут за 1 час до поездки и по мере необходимости в течение 1 часа во время поездки. Затем принимать по 1 таблетке 3 раза в день. При необходимости, после консультации с врачом, препарат может быть назначен в дозировке по 3 таблетки 3 раза в день. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных). Дети до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактозы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2-3 недель следует обратиться к врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении