Инструкция по применению
Вертран Таблетки 16 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Хорватия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 16 мг



Описание

Круглые, плоские таблетки белого или почти белого цвета со скошенными краями, с риской на одной стороне.

Действующее вещество

Бетагистин

Состав

1 таблетка содержит:Действующее вещество: бетагистина дигидрохлорид 16 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 303,619 мг, маннитол - 108,081 мг, лимонной кислоты моногидрат - 9,40 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 9,40 мг, тальк - 23,50 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбируется быстро, связь с белками плазмы - низкая. Время достижения максимальной концентрации в плазме (TCmax) 3 часа. Метаболизируется до неактивных метаболитов: 2-пиридилуксусной кислоты (основной метаболит) и деметилбетагистина. 85-90% выводится почками в виде 2-пиридилуксусной кислоты в течение 24 часов. Выведение бетагистина и деметилбетагистина почками незначительно. Кишечником выводится лишь небольшая часть бетагистина и его метаболитов.

Показания

Лечение синдрома Меньера, характеризующегося головокружением (сопровождающееся тошнотой и рвотой), снижением слуха и шумом в ушах, симптоматическое лечение вестибулярного головокружения (вертиго).

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды.Таблетки 8 мг: 1-2 таблетки 3 раза в день.Таблетки 16 мг: 1/2-1 таблетка 3 раза в день.Улучшение обычно отмечается уже в начале терапии, стабильный терапевтический эффект наступает после, двух недель лечения и может нарастать в течение нескольких месяцев лечения.Лечение длительное.Длительность приёма препарата подбирается индивидуально.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, беременность и период лактации (в связи с отсутствием данных), детский возраст, непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение при беременности и кормлении грудью

Недостаточно данных для оценки воздействия препарата в период беременности и лактации. В связи с этим не рекомендуется прием при беременности. На время лечения необходимо прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, абдоминальная боль, вздутие живота, диспепсия.Со стороны кожных покровов: ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь.Аллергические реакции: гиперчувствительность, в т.ч. анафилактические реакции.

Передозировка

Симптомы: тошнота, абдоминальная боль, сонливость (при приеме в дозе до 640 мг), судороги, сердечно-сосудистые осложнения (при приеме в дозе более 640 мг или в сочетании с другими лекарственными средствами).Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особые указания

Терапевтический эффект в ряде случаев нарастает в течение нескольких месяцев от начала лечения.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами:Бетагистин не обладает седативным эффектом и не влияет на способность управлять автомобилем или заниматься видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.