Инструкция по применению
Вертран таблетки 8мг N30

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Хорватия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 8 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Бетагистин

Состав

Бетагистина дигидрохлорид 8 мг Вспомогательные вещества: МКЦ, маннитол, лимонной кислоты моногидрат, кремния диоксид коллоидный, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь бетагистина дигидрохлорид быстро и практически полностью абсорбируется из ЖКТ. Связывание с белками плазмы низкое. Практически полностью выводится из организма с мочой в течение 24 ч. T1/2 - 3-4 ч.

Показания

Болезнь Меньера. синдромы, характеризующиеся головокружением, шумом в ушах и /или прогрессирующей потерей слуха, в т.ч. водянка лабиринта внутреннего уха, вестибулярные и лабиринтные нарушения (включая головокружение, шум и боль в ушах, головная боль, тошнота, рвота, снижение слуха), вестибулярный неврит, лабиринтит, доброкачественное позиционное головокружение (в т.ч. после нейрохирургических операций). вертебробазилярная недостаточность, посттравматическая энцефалопатия, атеросклероз сосудов головного мозга (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Способ приминения Разовая доза - 8-16 мг, кратность приема - 3 раза/сут. Лечение проводят длительно.

Противопоказания

Феохромоцитома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, бронхиальная астма, I триместр беременности, повышенная чувствительность к бетагистину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение в I триместре беременности и в период лактации. С осторожностью следует применять во II и III триместрах беременности.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы возможны незначительно выраженные тошнота, чувство тяжести в эпигастрии.Аллергические реакции в отдельных случаях - кожная сыпь, зуд, крапивница.

Взаимодействие с другими препаратами

Антигистаминные препараты при одновременном приеме снижают эффект бетагистина.

Особые указания

С осторожностью следует применять у пациентов с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, во II и III триместрах беременности, а также у детей. Необходимо учитывать, что желаемый клинический эффект достигается после нескольких месяцев лечения. При диспептических симптомах бетагистин рекомендуется принимать во время или после еды.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении