Инструкция по применению
Вессел Дуэ Ф капсулы 250 ЛЕ 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Италия
Производитель: Альфасигма Рус
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Сулодексид
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 250 ЛЕ
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Сулодексид

Состав

1 капс.:сулодексид 250 ЛЕ*Вспомогательные вещества: лаурилсаркозинат натрия - 3.3 мг, кремния диоксид коллоидный - 3 мг, триглицериды - 86.1 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределениеПосле приема внутрь сулодексид всасывается из тонкой кишки. 90% сулодексида абсорбируется эндотелием сосудов, что превышает его концентрацию в тканях других органов в 20-30 раз.МетаболизмМетаболизируется в печени и почках. В отличие от нефракционированного гепарина и низкомолекулярных гепаринов, сулодексид не подвергается десульфатированию, которое приводит к снижению антитромботической активности и значительно ускоряет элиминацию из организма.ВыведениеВыводится почками через 4 ч после введения.После в/в введения через 24 ч экскреция с мочой составляет 50%, через 48 ч - 67%.

Показания

- ангиопатии с повышенным риском тромбообразования, в т.ч. и после перенесенного инфаркта миокарда;- нарушение мозгового кровообращения, включая острый период ишемического инсульта и период раннего восстановления;- дисциркуляторная энцефалопатия, обусловленная атеросклерозом, сахарным диабетом, артериальной гипертензией;- сосудистая деменция;- окклюзионные поражения периферических артерий как атеросклеротического, так и диабетического генеза;- флебопатии, тромбозы глубоких вен;- микроангиопатии (нефропатия, ретинопатия, невропатия);- макроангиопатии при сахарном диабете (синдром диабетической стопы, энцефалопатия, кардиопатия);- тромбофилические состояния, антифосфолипидный синдром (назначают совместно с ацетилсалициловой кислотой, а также вслед за низкомолекулярными гепаринами);- лечение гепарин-индуцированной тромботической тромбоцитопении (поскольку препарат не вызывает и не усугубляет ее).

Способ применения и дозы

В начале терапии препарат вводят парентерально в/м или в/в (болюсно или капельно) по 2 мл (1 ампула) раствора для инъекций (600 ЛЕ) в течение 15-20 дней. Для приготовления раствора для в/в введения содержимое 1 ампулы разводят в 150-200 мл физиологического раствора.Затем переходят на прием препарата внутрь. Назначают по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза/сут в течение 30-40 дней.Капсулы принимают между приемами пищи.Полный курс лечения следует повторять не менее 2 раз в год.В зависимости от результатов клинико-диагностического обследования пациента, режим дозирования может быть изменен.

Противопоказания

- геморрагические диатезы и заболевания, сопровождающиеся пониженной свертываемостью крови;- I триместр беременности;- гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение в I триместре беременности.Имеется положительный опыт применения сулодексида у пациенток с сахарным диабетом типа 1 во II и III триместрах беременности с целью лечения и профилактики сосудистых осложнений, при развитии позднего токсикоза беременных.Применять препарат Вессел Дуэ Ф при беременности во II и III триместрах следует строго под наблюдением врача.Данные о применении препарата в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боли в эпигастрии. Аллергические реакции: кожная сыпь различной локализации.Местные реакции: боль, жжение, гематома в месте инъекции.

Передозировка

Симптомы: кровоточивость или кровотечение.Лечение: отмена препарата; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата Вессел Дуэ Ф с другими препаратами не установлено.При применении сулодексида не рекомендуется одновременно использовать антикоагулянты (прямые и непрямые) и антиагреганты.

Особые указания

При применении препарата необходим контроль коагулограммы. В начале и конце лечения целесообразно определить следующие показатели: АЧТВ, антитромбин III, время кровотечения и время свертывания. Вессел Дуэ Ф увеличивает нормальные показатели АЧТВ приблизительно в 1.5 раза.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей