Инструкция по применению
Вестикап капсулы 16 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 16 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Бетагистин

Состав

Бетагистина дигидрохлорид 16 мг;Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 86 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 47 мг, крахмал картофельный - 20 мг, коповидон - 18 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 10 мг, кремния диоксид коллоидный - 1 мг, магния стеарат - 2 мг.;Состав капсулы: краситель азорубин, краситель индигокармин, титана диоксид, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределение;После приема препарата внутрь бетагистин быстро абсорбируется, связывание с белками плазмы - низкое. Время достижения Cmax в плазме 3 ч.;Метаболизм и выведение;Метаболизируется до неактивных метаболитов: 2-пиридилуксусной кислоты (основной метаболит) и деметилбетагистина.;85-90% выводится почками в виде 2-пиридилуксусной кислоты в течение 24 ч. Выведение бетагистина и деметилбетагистина почками незначительно. Через кишечник выводится лишь небольшая часть бетагистина и его метаболитов.

Показания

— лечение синдрома Меньера, характеризующегося головокружением (сопровождающееся тошнотой и рвотой), снижением слуха и шумом в ушах; — симптоматическое лечение вестибулярного головокружения (вертиго).

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Капсулы 8 мг: по 1-2 капсулы 3 раза/сут. Капсулы 16 мг: по 1 капсуле 3 раза/сут.;Улучшение обычно отмечается уже в начале терапии, стабильный терапевтический эффект наступает после двух недель лечения и может нарастать в течение нескольких месяцев лечения. Лечение длительное. Длительность приема препарата подбирается индивидуально.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; — беременность; — период лактации (в связи с отсутствием данных); — детский возраст; — непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.;С осторожностью: язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки (в т.ч. в анамнезе), феохромоцитома, бронхиальная астма. Пациентов этих групп следует регулярно наблюдать в период лечения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Недостаточно данных для оценки воздействия препарата в период беременности и лактации. В связи с этим не рекомендуется прием при беременности. На время лечения необходимо прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, абдоминальная боль, вздутие живота, диспепсия.;Со стороны кожных покровов: ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь.;Аллергические реакции: гиперчувствительность, в т.ч. анафилактические реакции.

Передозировка

Симптомы: тошнота, абдоминальная боль, сонливость (при приеме в дозе до 640 мг); судороги, сердечно-сосудистые осложнения (при приеме в дозе более 640 мг или в сочетании с другими лекарственными средствами).;Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особые указания

Терапевтический эффект в ряде случаев нарастает в течение нескольких месяцев от начала лечения.;Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Бетагистин не обладает седативным эффектом и не влияет на способность управлять автомобилем или заниматься видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте