Инструкция по применению
Вестикап капсулы 16 мг 30 шт х 2

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 16 мг



Описание

Гистамина препарат

Действующее вещество

Бетагистин

Состав

бетагистина дигидрохлорид Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 129 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 70.5 мг, крахмал картофельный - 30 мг, коповидон - 27 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 15 мг, кремния диоксид коллоидный - 1.5 мг, магния стеарат - 3 мг.Состав капсулы: крышечка - индигокармин 0.0312 %, титана диоксид 4 %, желатин до 100 %, корпус - индигокармин 0.0312 %, титана диоксид 4 %, желатин до 100 %.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределениеПосле приема препарата внутрь бетагистин быстро абсорбируется, связывание с белками плазмы - низкое. Время достижения Cmax в плазме 3 ч.Метаболизм и выведениеМетаболизируется до неактивных метаболитов: 2-пиридилуксусной кислоты (основной метаболит) и деметилбетагистина.85-90% выводится почками в виде 2-пиридилуксусной кислоты в течение 24 ч. Выведение бетагистина и деметилбетагистина почками незначительно. Через кишечник выводится лишь небольшая часть бетагистина и его метаболитов.

Показания

лечение синдрома Меньера, характеризующегося головокружением (сопровождающееся тошнотой и рвотой), снижением слуха и шумом в ушах, симптоматическое лечение вестибулярного головокружения (вертиго).

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Капсулы 8 мг: по 1-2 капсулы 3 раза/сут. Капсулы 16 мг: по 1 капсуле 3 раза/сут.Улучшение обычно отмечается уже в начале терапии, стабильный терапевтический эффект наступает после двух недель лечения и может нарастать в течение нескольких месяцев лечения. Лечение длительное. Длительность приема препарата подбирается индивидуально.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата,беременность, период лактации (в связи с отсутствием данных),детский возраст,непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.С осторожностью: язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки (в т.ч. в анамнезе), феохромоцитома, бронхиальная астма. Пациентов этих групп следует регулярно наблюдать в период лечения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Недостаточно данных для оценки воздействия препарата в период беременности и лактации. В связи с этим не рекомендуется прием при беременности. На время лечения необходимо прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, абдоминальная боль, вздутие живота, диспепсия.Со стороны кожных покровов: ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь.Аллергические реакции: гиперчувствительность, в т.ч. анафилактические реакции.

Передозировка

Симптомы: тошнота, абдоминальная боль, сонливость (при приеме в дозе до 640 мг), судороги, сердечно-сосудистые осложнения (при приеме в дозе более 640 мг или в сочетании с другими лекарственными средствами).Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особые указания

Терапевтический эффект в ряде случаев нарастает в течение нескольких месяцев от начала лечения.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиБетагистин не обладает седативным эффектом и не влияет на способность управлять автомобилем или заниматься видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.