Инструкция по применению
Ветом 4 Капсулы 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: НПФ Исследовательский Центр
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50

Описание

Оздоровительный эффект Ветом 4 обеспечивается свойствами бактерий Bacillus amyloliquefaciens, которые, размножаясь преимущественно в тонком отделе кишечника, выделяют протеолитические, амилолитические, целлюлозолитические ферменты, биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Вследствие этого процесса в кишечнике нормализуется микробный состав до соответствующего эволюционно сложившейся норме, очищаются его стенки от неперевариваемых остатков пищи, что способствует активному выводу токсинов из организма, беспрепятственной доставке биологически активных и питательных веществ. Под воздействием Ветома 4 нормализуются: метаболизм, пищеварение и всасывание биологически активных компонентов пищи в желудочно-кишечном тракте.

Состав

1 доза БАД (1 капсула) содержит: экстракт кукурузный – 133 мг; крахмал картофельный – 100 мг; сахарная пудра – 67 мг; сухая культура пробиотических микроорганизмов Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ B-10643 (DSM 24615), 1x109 КОЕ/г – 30 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище как дополнительный источник пробиотических микроорганизмов для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и восстановления микрофлоры кишечника.

Способ применения и дозы

Рекомендуется принимать в течение 10 дней по (2-3) дозы в день во время или после приема пищи, запивая небольшим количеством воды, сока или чая.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в период беременности и лактации возможно после консультации с врачом.

Побочные действия

Побочные эффекты компонентов препарата при использовании в рекомендуемых дозах не выявлены.

Передозировка

Официальная инструкция не предоставляет информацию о негативных последствиях приема завышенных доз данных БАДов.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных о комбинации с другими веществами нет.

Особые указания

Применение в период беременности и лактации возможно после консультации с врачом. БАД не влияет на способность управлять автотранспортом или потенциально опасными механизмами.

Условия хранения

В сухом затемненном проветриваемом помещении