Инструкция по применению
Ветом-2 Капсулы 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50



Описание

Оздоровительный эффект обеспечивается свойствами бактерий Bacillus amyloliquefaciens, которые, размножаясь в кишечнике, выделяют протеолитические, амилолитические, целлюлозолитические ферменты, биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Вследствие этого процесса в кишечнике нормализуется микробный состав до соответствующего эволюционно сложившейся норме, очищаются его стенки от неперевариваемых остатков пищи, что способствует активному выводу токсинов из организма, беспрепятственной доставке биологически активных и питательных веществ. Под воздействием Ветома 2 нормализуются: метаболизм, пищеварение и всасывание биологически активных компонентов пищи в желудочно-кишечном тракте. капсулы массой 0,33 гр

Состав

1 доза БАД (1 капсула) содержит: экстракт кукурузный – 133 мг, крахмал картофельный –100 мг, сахароза (сахарная пудра) – 67 мг, сухая культура пробиотических микроорганизмов Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614), Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615), 1х109 КОЕ /г – 30 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище как дополнительный источник пробиотических микроорганизмов для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и восстановления микрофлоры кишечника.

Способ применения и дозы

Рекомендуется принимать в течение 10 дней по (2-3) дозы в день во время или после приема пищи, запивая небольшим количеством воды, сока или чая.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Побочные действия

При приеме препарата Ветом возможно возникновение болевых ощущений в пораженных частях организма.

Взаимодействие с другими препаратами

Не применять совместно с антибиотиками и другими препаратами на основе пробиотических микроорганизмов

Особые указания

Применение в период беременности и лактации возможно после консультации с врачом. БАД не влияет на способность управлять автотранспортом или потенциально опасными механизмами.