Инструкция по применению
Люголь Виалайн спрей 45 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Армения
Производитель: Эско-Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Компоненты средства гигиены полости рта «Люголь-Виалайн» сочетают в себе антисептические и противовоспалительные свойства. При производстве используется сырье, собранное в чистой природе горных районов Армении.Экстракт зеленого грецкого орехаУникальный источник природного йода.Экстракт коры дубаСодержащиеся в нем дубильные вещества оказывают вяжущее и противовоспалительное действие.Экстракт зверобояИспользуют как вяжущее и антисептическое средство.

Состав

Вода очищенная, глицерин, экстракт коры дуба, экстракт зверобоя, экстракт грецкого ореха, калия йодид.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

В случае применения препарата в рекомендуемых дозах, резорбция йода через кожу и слизистые оболочки полости рта незначительна. При контакте со слизистыми оболочками на 30 % превращается в йодиды.При случайном проглатывании йод быстро всасывается. Адсорбированная часть хорошо проникает в ткани и органы, накапливается в тканях щитовидной железы. Выводится почками (главным образом), в меньшей степени с каловыми массами и с потом. Проникает в молоко лактирующих женщин.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и глотки у взрослых и детей.

Способ применения и дозы

Препарат применяется местно 4-6 раз в сутки для орошения слизистой оболочки рта, глотки, зева, распыляя спрей одним нажатием головки распылителя.В момент впрыскивания рекомендуется задержать дыхание.Впрыск препарата точечный и распылитель в зависимости от заболевания нужно направлять прямо в очаг воспаления.В случае использования новой упаковки препарата следует снять защитный колпачок, надеть головку распылителя с наконечником и несколько раз нажать на головку распылителя.После использования препарата снимать головку распылителя с наконечником не рекомендуется.Не допускать попадание препарата в глаза. Если это произошло, глаза следует промыть большим количеством воды или раствором натрия тиосульфата.Если симптомы воспаления не уменьшаются или усиливаются после 2-3 дней терапии, то необходимо проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется для длительного (более 2 недель) применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду или другим компонентам препарата, декомпенсированные заболевания печени и почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в период беременности противопоказано. Йод проникает в молоко матери и потенциально может оказывать влияние на функцию щитовидной железы у детей, находящихся на грудном вскармливании. Применение при грудном вскармливании возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции. При длительном применении - явления "йодизма": ринит, крапивница, ангионевротический отек, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь. Если при применении препарата проявляется указанное или иное побочное действие необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Симптомы: раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларингобронхоспазм), при попадании внутрь - слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, развитие гемолиза, гемоглобинурии, смертельная доза -около 3 г (около 300 мл препарата). Лечение: промывание желудка 0,5 % раствором натрия тиосульфата, растворами натрия гидрокарбоната, в/в вводится натрия тиосульфат 30 % - до 300 мл.

Взаимодействие с другими препаратами

Йод инактивируется натрия тиосульфатом. Содержащийся в составе препарата йод окисляет металлы, что может приводить к порче металлических предметов. Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность. В случае попадания препарата внутрь может снижаться действие лекарственных средств, подавляющих функцию щитовидной железы, а также могут изменяться показатели функции щитовидной железы. Препараты йода могут усиливать раздражающее действие некоторых лекарственных средств (в т.ч. ацетилсалициловой кислоты) на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Особые указания

Солнечный свет и температура выше 40 °С ускоряют распад активного йода. Необходимо избегать регулярного использования у пациентов с гипертиреозом (тиреотоксикозом). Детям до 12 лет применять после консультации с врачом. Может повлиять на результаты лабораторных данных при исследовании гормонов щитовидной железы.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.