Инструкция по применению
Виброцил Капли назальные 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Швейцария
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диметинден+Фенилэфрин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Описание

Виброцил капли — бережная забота для маленьких носиков1. Препарат разрешён к применению для детей с 1 года. 2 активных компонента препарата Виброцил капли от заложенности носа и проявлений аллергии способствуют мягкому лечению различных видов насморка*. Действие происходит за счёт сосудосуживающего и антигистаминного действий активных веществ1,3. Лавандовое масло, входящее в состав капель, обладает нежным ароматом и делает процедуру лечения более приятной. Виброцил в форме назальных капель применяется в борьбе с простудным насморком, симптомами острого и хронического ринита и синусита, а также обладает противоаллергическим действием*1. Капли Виброцил помогают уменьшать1: • заложенность носа; • отек слизистой оболочки; • ощущение зуда в носу. Препарат можно непрерывно применять в течение 7 дней. Какой препарат Виброцил может подойти вам больше? Виброцил капли можно использовать для заботы о самых маленьких носиках с 1 года, а Виброцил спрей применяется для взрослых и детей с 6 лет*1-2. *кроме медикаментозного. С полным перечнем показаний можно ознакомиться в ИМП препарата Виброцил капли назальные РУ П №015192/03 от 20.11.2019. 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Виброцил капли назальные РУ П №015192/03 от 20.11.2019. 2. Действующие вещества: фенилэфрин + диметинден 3. Е. Г. ШАХОВА. Сравнительное исследование эффективности комбинированных назальных топических препаратов и топических деконгестантов в лечении острых риносинуситов, Вестник оториноларингологии 2020, Т. 85, №4, с. 46–50

Действующее вещество

Диметинден+Фенилэфрин

Состав

На 1 мл: Активные вещества: фенилэфрин 2.5 мг, диметиндена малеат 0.25 мг. Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50% раствор (в пересчете на бензалкония хлорид) - 0.2 мг (0.1 мг), лимонной кислоты моногидрат - 2.6 мг, натрия гидрофосфат - 4.4 мг, сорбитол - 35 мг, масло лаванды - 0.2 мг, вода - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Виброцил® предназначен для местного применения, и его активность не зависит от концентрации активных веществ в плазме крови.

Показания

острый ринит (в т.ч. при простудных заболеваниях), аллергический ринит (в т.ч. при сенной лихорадке), вазомоторный ринит, хронический ринит, острый и хронический синусит, острый средний отит (в качестве вспомогательного средства), подготовка к хирургическим вмешательствам в области носа и устранение отека слизистой оболочки носа и придаточных пазух после хирургического вмешательства в этой области.

Способ применения и дозы

Перед применением рекомендуется тщательно очистить носовые ходы, закапывают в нос, запрокинув голову. Это положение головы сохраняют в течение нескольких минут. Препарат не следует применять непрерывно более 7 дней. Если симптомы не проходят, следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Атрофический ринит (в т.ч. со зловонным отделяемым - озена), одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после их отмены, закрытоугольная глаукома, детский возраст до 1 года, повышенная чувствительность к фенилэфрину, диметиндена малеату или другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Учитывая возможное системное сосудосуживающее действие, Виброцил® не рекомендуется применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Определение частоты побочных эффектов (ВОЗ): Со стороны дыхательной системы: Редко Местные реакции: Редко Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются, или пациент заметил любые другие побочные эффекты, он должен сообщить об этом врачу.

Передозировка

Передозировка препаратом Виброцил® может вызывать симпатомиметические эффекты, например, учащенное сердцебиение, преждевременное сокращение желудочков сердца, головную боль в области затылка, тремор, чувство усталости, повышение АД, эмоциональное возбуждение, бессонницу, бледность кожных покровов. Препарат также может вызывать легкий седативный эффект, головокружение, чувство боли в желудке, тошноту, рвоту. Лечение: применение активированного угля, слабительных у детей младшего возраста, у взрослых и детей старше 6 лет - прием большого количества жидкости. Специфического антидота нет. Повышенное АД, вызванное фенилэфрином, можно устранить при помощи применения альфа-адреноблокаторов.

Взаимодействие с другими препаратами

Фенилэфрин (как и другие сосудосуживающие средства) противопоказан больным, получающим ингибиторы МАО в данное время или получавшим их в течение 2 предыдущих недель. Не следует назначать одновременно препарат с три- и тетрациклическими антидепрессантами, бета-адреноблокаторами.

Особые указания

Виброцил® не следует применять непрерывно на протяжении более 7 дней без консультации с врачом. Длительное или чрезмерное применение препарата может вызвать тахифилаксию и эффект рикошета, связанный с повторным развитием заложенности носа (медикаментозный ринит), привести к развитию системного сосудосуживающего действия. Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата Виброцил®. В противном случае возможно развитие проявлений системного действия препарата, особенно у детей и пациентов пожилого возраста. У детей в возрасте младше 6 лет применяют только капли в нос. Виброцил® не оказывает седативного действия (не влияет на скорость психомоторных реакций). Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами Не влияет.

Условия хранения

В сухом месте