Инструкция по применению
Виброцил Спрей назальный 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Швейцария
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Виброцил спрей — комплексный препарат для лечения различных видов ринита* и синусита в удобном формате с дозированным распылением1. Виброцил спрей назальный помогает бороться с симптомами острого и хронического ринита и синусита, а также обладает противоаллергическим действием. В составе препарата два активных компонента: сосудосуживающий и антигистаминный2. Лавандовое масло, входящее в состав спрея, обладает нежным ароматом и делает процедуру лечения более приятной. Виброцил спрей помогает уменьшать1: • заложенность; • отек слизистой оболочки; • проявления аллергического ринита: течение из носа, зуд, чихание. Комбинированный препарат Виброцил спрей способствует мягкому и бережному лечению ринита и синусита, поэтому он подходит как для взрослых, так и для детей с 6 лет1. Препарат можно применять непрерывно в течение 7 дней по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки1. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Какой препарат Виброцил может подойти вам больше? Виброцил спрей применяется для взрослых и детей с 6 лет, а Виброцил капли можно использовать для заботы о маленьких носиках с 1 года1,3. *кроме медикаментозного. С полным перечнем показаний можно ознакомиться в ИМП препарата Виброцил спрей назальный дозированный РУ П №015192/02 от 24.08.2021. 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Виброцил спрей назальный дозированный РУ П №015192/02 от 24.08.2021. 2. МНН: фенилэфрин + диметинден 3. Инструкция по медицинскому применению препарата Виброцил капли назальные РУ П №015192/03 от 20.11.2019. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Виброцил предназначен для местного применения, и его активность не зависит от концентрации активных веществ в плазме крови.

Показания

Острый ринит (в т.ч., насморк при простудных заболеваниях); аллергический ринит (в т.ч. при сенной лихорадке); вазомоторный ринит; хронический ринит; острый и хронический синусит; острый средний отит (в качестве вспомогательного метода лечения). Подготовка к хирургическим вмешательствам в области носа и устранение отека слизистой оболочки носа и придаточных пазух после хирургических вмешательств в этой области.

Способ применения и дозы

Детям в возрасте старше 6 лет и взрослым назначают по 1-2 вспрыскивания в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. При использовании спрея распылитель следует держать вертикально, наконечником кверху. Держа голову прямо, вставляют наконечник в носовой ход, один раз коротким резким движением сжимают распьшитель, а вынув наконечник из носа, разжимают. Во время вспрыскивания рекомендуется слегка вдохнуть через нос. Перед введением препарата следует тщательно очистить носовые ходы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Атрофический ринит (в том числе, со зловонным отделяемым - озена). Прием ингибиторов МАО (одновременно или в предшествующие 14 дней).С осторожностью применяется у больных артериальной гипертензией, аритмиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у больных с генерализованным атеросклерозом, заболеваниями щитовидной железы, закрытоугольной глаукомой, аденномой предстательной железы, инсулинозависимым сахарным диабетом.Как и в случае применения любых местных сосудосуживающих средств, следует соблюдать осторожность при назначении Виброцила пациентам с выраженными реакциями на симпатомиметики (например, с развитием бессонницы и головокружения).Препарат не рекомендуется принимать во время беременности без рекомендации врача.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется принимать во время беременности без рекомендации врача. Препарат не рекомендуется применять в период грудного вскармливания. Фенилэфрин и диметиндена малеат могут проникать в грудное молоко.

Побочные действия

Слабо выраженные и транзиторные местные реакции со стороны слизистой оболочки носа (чувство жжения или сухости).

Передозировка

При случайном приеме Виброцила внутрь маленькими детьми не отмечено каких-либо серьезных побочных эффектов. В большинстве случаев симптомы передозировки отсутствовали, однако, иногда сообщалось о таких симптомах как чувство усталости, боль в области желудка, тахикардия, артериальная гипертензия, возбуждение, бессонница, бледность кожных покровов (чаще у детей при случайном приеме внутрь).Лечение: применение активированного угля, слабительных (промывание желудка не требуется); у взрослых и детей старше 6 лет - прием большого количества жидкости. Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Фенилэфрин (как и другие сосудосуживающие средства) противопоказан больным, получающим ингибиторы МАО в данное время или получавшим их в течение двух предыдущих недель. Не следует назначать одновременно препарат с трициклическими антидепрессантами или антигипертензивными препаратами, например, бета-адреноблокаторами.