Инструкция по применению
Видисик Гель глазной 0,2 % 10 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Карбомер
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.2%
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Карбомер

Состав

Карбомер 2 мгВспомогательные вещества: цетримид, сорбитол, натрия гидроксид, вода д/и.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Препарат не проникает в глаз и не накапливается в тканях.

Показания

Недостаточная продукция слезной жидкости;синдром сухого глаза.

Способ применения и дозы

Гель глазной закапывают по 1 капле в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 3-5 раз/сут в зависимости от тяжести и выраженности жалоб.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует применять Видисик при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, преходящее затуманивание зрения, чувство жжения, раздражение глаз.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Видисик отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

В тех случаях, когда проводится дополнительная местная терапия, интервал между введением Видисика и других препаратов должен составлять не менее 5 мин. Видисик следует применять последним.

Особые указания

В период применения препарата не рекомендуют ношение мягких контактных линз. При ношении контактных линз их следует снять перед использованием геля и не устанавливать раньше чем через 15 мин после инстилляции препарата.Тубу следует закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком тубы к глазу.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей