Инструкция по применению
Викаир Фармстандарт Таблетки 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аира корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат
Количество в упаковке: 10

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской, розового или розовато-лилового цвета с белыми и темными вкраплениями.

Действующее вещество

Аира корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат

Состав

На одну таблетку: Действующие вещества: висмута субнитрат - 0,350 г, магния гидроксикарбонат - 0,400 г, натрия гидрокарбонат - 0,200 г, крушины ольховидной кора - 0,025 г, аира корневища - 0,025 г. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,130 г, стеариновая кислота - 0,0048 г, тальк - 0,0152 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит с повышенной секреторной функцией желудка.

Способ применения и дозы

Внутрь, через 1-1,5 часов после еды, запивая небольшим количеством (1/4 стакана) воды, по 1-2 таблетки 3 раза в день. Курс лечения продолжается обычно 1-2 месяца. При необходимости курс повторяют после месячного перерыва.

Противопоказания

Гиперчувствительность, гипоацидный гастрит, хроническая почечная недостаточность, энтероколит, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), беременность, период лактации (грудного вскармливания).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Таблетки обычно не вызывают побочных явлений, иногда наблюдается учащение стула. Кал во время приема таблеток может приобретать темно-зеленый или черный цвет. При применении препарата возможны аллергические реакции.

Передозировка

Данные о передозировке препаратом отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в крови.

Особые указания

Нецелесообразно назначать больным с язвенной болезнью в сочетании с хроническим аппендицитом, энтероколитом, холециститом и больным с наклонностью к кровотечениям. Необходимо учитывать развитие энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в центральной нервной системе. В период лечения кал окрашивается в черный цвет.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Данные о влиянии препарата на способность управления транспортным средством и выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, отсутствуют.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.