Инструкция по применению
Викаир таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аира корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 0.35 г+0.4 г+0.2 г+0.025 г+0.025 г

Описание

Викаир - комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие. Магния гидроксикарбонат снижает кислотность желудочного сока, уменьшает активность пепсина. Висмута субнитрат оказывает противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие. Препарат выпускается в форме плоскоцилиндрических таблеток розового или розовато-лилового цвета с белыми и темными вкраплениями. Применяется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидном гастрите с повышенной секреторной функцией желудка. Имеются противопоказания (в том числе, беременность, детский возраст до 18 лет). Отпускается без рецепта.

Действующее вещество

Аира корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат

Состав

Каждая таблетка содержит: Активные действующие вещества: Висмута нитрат основной – 0,35 г, магния карбонат основной – 0,4 г, натрия гидрокарбонат – 0,2 г, кора крушины в порошке – 0,025 г, корневища аира порошок – 0,025 г. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кислота стеариновая, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит с повышенной секреторной функцией желудка.

Способ применения и дозы

Внутрь, через 1-1.5 ч после еды, запивая небольшим количеством (1/4 стакана) воды, по 1-2 таблетки 3 раза в день. Курс лечения продолжается обычно 1-2 месяца. При необходимости курс повторяют после месячного перерыва

Противопоказания

Гиперчувствительность, гипоацидный гастрит, хроническая почечная недостаточность, энтероколит, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), беременность, период лактации (грудного вскармливания).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Таблетки обычно не вызывают побочных явлений, иногда наблюдается учащение стула. Кал во время приема таблеток может приобретать темно-зеленый или черный цвет. При применении препарата возможны аллергические реакции.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в крови.

Особые указания

Нецелесообразно назначать больным с язвенной болезнью в сочетании с хроническим аппендицитом, энтероколитом, холециститом и больным с наклонностью к кровотечениям. Необходимо учитывать развитие энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в центральной нервной системе. В период лечения кал окрашивается в черный цвет.

Условия хранения

При температуре не выше 25С. Хранить в недоступном для детей месте.