Инструкция по применению
Викаир Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аира корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 0.35 г+0.4 г+0.2 г+0.025 г+0.025 г

Описание

Таблетки розового или розовато-лилового цвета с белыми и темными вкраплениями, плоскоцилиндрические с фаской и риской.

Действующее вещество

Аира корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат

Состав

1 таблетка содержит: активное вещество: висмута нитрат основной - 0,35 г магния карбонат основной - 0,4 г натрия гидрокарбонат - 0,2 г крушины кора в порошке - 0,025 г аира корневища в порошке - 0,025 г вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,1155 г тальк - 0,0230 г стеариновая кислота - 0,0115 г

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Не описано.

Показания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в день через 1-1,5 часа после еды с % стакана теплой воды (таблетки следует измельчить или растворить в указанном количестве воды). Курс лечения - 1-2 месяца. Повторный курс - после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипоацидный гастрит, почечная недостаточность, беременность, период лактации, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, учащение стула.

Передозировка

Не описано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Кал во время приема препарата приобретает темную окраску. Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в ЦНС при длительном применении препарата в высоких дозах. Нецелесообразно назначать больным с язвенной болезнью в сочетании с хроническим аппендицитом, энтероколитом, холециститом и больным с наклонностью к кровотечениям.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет сведений.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.