Инструкция по применению
Викалин Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аира корневища+Висмута субнитрат+Келлин+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат+Рутозид
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 25 мг+350 мг+5 мг+25 мг+400 мг+200 мг+5 мг

Описание

Таблетки светло-коричневого цвета с заметными вкраплениями, в изломе светло-коричневого цвета, однородные или с вкраплениями темного цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской.

Действующее вещество

Аира корневища+Висмута субнитрат+Келлин+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат+Рутозид

Состав

1 таблетка содержит: активное вещество: Висмута нитрат основной - 0,35 г, магния карбонат основной - 0,4 г, натрия гидрокарбонат - 0,2 г, кора крушины в порошке - 0,025 г, корневища аира в порошке 0,025 г, келлин - 0,005 г, рутин - 0,005 г. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,0647, тальк - 0,0055 г, стеариновая кислота - 0,0198 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в день после еды с 1/4 стакана теплой воды (таблетки следует измельчить или растворить в указанном количестве воды). Курс лечения - 1-2 месяца. Повторный курс - после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипоацидный гастрит, почечная недостаточность, беременность, лактация.

Побочные действия

Аллергические реакции, учащение стула.

Особые указания

Кал во время приема препарата приобретает темно-зеленую или черную окраску. Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в ЦНС при длительном применении препарата в высоких дозах. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет сведений.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.