Инструкция по применению
Викалин Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аира корневища+Висмута субнитрат+Келлин+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат+Рутозид
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 25 мг+350 мг+5 мг+25 мг+400 мг+200 мг+5 мг

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, светло-коричневого цвета с заметными вкраплениями.

Действующее вещество

Аира корневища+Висмута субнитрат+Келлин+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат+Рутозид

Состав

Действующие вещества: Висмута нитрат основной - 350,0 мг, Магния карбонат основной - 400,0 мг, Натрия гидрокарбонат - 200,0 мг, Крушины кора, порошок - 25,0 мг, Аира корневища, порошок - 25,0 мг, Келлин - 5,0 мг, Рутин - 5,0 мг
Вспомогательные вещества: Крахмал картофельный - 65,0 мг, Тальк - 20,0 мг, Стеариновая кислота - 5,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В составе комплексной терапии: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки гиперацидный гастрит.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в день после еды с 1/4 стакана теплой воды (таблетки следует измельчить или растворить в указанном количестве воды). Курс лечения 1-2 месяца. Повторный курс - после консультации с врачом. Меры предосторожности при применении: Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии связанной с накоплением висмута в центральной нервной системе при длительном применении препарата в высоких дозах. Кал во время приема препарата приобретает в темно-зеленую или черную окраску.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата гипоацидный гастрит почечная недостаточность хронический аппендицит энтероколит детский возраст до 18 лет беременность лактация.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности и лактации противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции учащение стула.

Передозировка

Данные по передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с тетрациклинами снижается всасывание последних. В сочетании с другими препаратами содержащими висмут повышается содержание висмута в крови. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Не описано. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: С осторожностью при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.