Инструкция по применению
Викасол Раствор для инъекций ампулы 1 % 1 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Менадиона натрия бисульфит
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг/мл
Срок годности: 24

Действующее вещество

Менадиона натрия бисульфит

Состав

Менадиона натрия бисульфит 10 мг на 1 мл Вспомогательные вещества: натрия дисульфит 1 мг, хлористоводородной кислоты раствор 0.1 М до pH 2.2-3.5, вода д/и до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

После приема внутрь абсорбируется из ЖКТ. Связывание с белками плазмы имеет обратимый характер. Накапливается главным образом в печени, селезенке, миокарде. В организме превращается в витамин К2. Наиболее интенсивно процесс превращения происходит в миокарде, скелетных мышцах, несколько слабее - в почках. Метаболиты витамина К (моносульфат, фосфат и диглюкуронид-2-метил-1.4-нафтохинон) выводятся с мочой - до 70%.

Показания

Геморрагический синдром, связанный с гипопротромбинемией; гиповитаминоз К (в т. ч. при обтурационной желтухе, гепатите, циррозе печени, длительной диарее); геморрагическая болезнь новорожденных; кровотечения после ранений, травм и хирургических вмешательств; в гинекологии в составе комплексного лечения дисфункциональных маточных кровотечений, не связанных с органической патологией, при меноррагии. Как специфический антагонист при кровотечениях, связанных с приемом непрямых антикоагулянтов. III триместр беременности (для предупреждения кровоточивости у новорожденных).

Способ применения и дозы

Взрослым при приеме внутрь - 15-30 мг/сут, в/м - 10-15 мг/сут. Детям в возрасте до 1 года - 2-5 мг/сут, до 2 лет - 6 мг/сут, 3-4 лет - 8 мг/сут, 5-9 лет - 10 мг/сут, 10-14 лет - 15 мг/сут. Частота приема - 2-3 раза/сут. Длительность лечения устанавливают индивидуально. Максимальные дозы: для взрослых при приеме внутрь разовая доза - 30 мг, суточная - 60 мг; при в/м введении разовая доза - 15 мг, суточная - 30 мг. Для новорожденных - 4 мг/сут.

Противопоказания

Повышенная свертываемость крови, тромбоэмболии, повышенная чувствительность к менадиону.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применяется при беременности по показаниям.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, эритема, крапивница, бронхоспазм. Со стороны свертывающей системы крови: гемолитическая болезнь новорожденных.

Передозировка

Симптомы: гипервитаминоз К, проявляющийся гиперпротромбинемией и гипертромбинемией, гипербилирубинемией, желтухой, повышением активности печеночных ферментов; отмечались боли в животе, запоры или диарея, общее возбуждение, ажитация и высыпания на коже. В единичных случаях у детей развивается токсикоз, проявляющийся судорогами. Лечение. Отменяют препарат. Под контролем показателей свертывающей системы назначают антикоагулянты. Терапия симптоматическая.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с пероральными антикоагулянтами возможно уменьшение антикоагулянтного действия.

Особые указания

При заболеваниях, приводящих к нарушению оттока желчи, рекомендуется парентеральное введение. При гемофилии и болезни Верльгофа менадион неэффективен.

Условия хранения

В сухом месте