Инструкция по применению
Викасол Таблетки 15 мг 30 шт банки



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Биосинтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Менадиона натрия бисульфит
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 15 мг
Срок годности: 2

Описание

Витамина К аналог синтетический

Действующее вещество

Менадиона натрия бисульфит

Состав

Менадиона натрия бисульфита тригидрат (викасол) 17.9 мг, в пересчете на безводное вещество 15 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 66.8 мг, крахмал картофельный - 14.1 мг, кальция стеарат - 1 мг, натрия дисульфит - 0.2 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь абсорбируется из ЖКТ. Связывание с белками плазмы имеет обратимый характер. Накапливается главным образом в печени, селезенке, миокарде. В организме превращается в витамин К2. Наиболее интенсивно процесс превращения происходит в миокарде, скелетных мышцах, несколько слабее - в почках. Метаболиты витамина К (моносульфат, фосфат и диглюкуронид-2-метил-1.4-нафтохинон) выводятся с мочой - до 70%.

Показания

Геморрагический синдром, связанный с гипопротромбинемией, гиповитаминоз К (в т. ч. при обтурационной желтухе, гепатите, циррозе печени, длительной диарее), геморрагическая болезнь новорожденных, кровотечения после ранений, травм и хирургических вмешательств, в гинекологии в составе комплексного лечения дисфункциональных маточных кровотечений, не связанных с органической патологией, при меноррагии. Как специфический антагонист при кровотечениях, связанных с приемом непрямых антикоагулянтов. III триместр беременности (для предупреждения кровоточивости у новорожденных).

Способ применения и дозы

Взрослым при приеме внутрь -15-30 мг/, в/м - 10-15 мг/ Детям в возрасте до 1 года - 2-5 мг/, до 2 лет - 6 мг/, 3-4 лет - 8 мг/, 5-9 лет - 10 мг/, 10-14 лет - 15 мг/ Частота приема - 2-3 Длительность лечения устанавливают индивидуально. Максимальные дозы: для взрослых при приеме внутрь разовая доза - 30 мг, суточная - 60 мг, при в/м введении разовая доза - 15 мг, суточная - 30 мг. Для новорожденных - 4 мг.

Противопоказания

Повышенная свертываемость крови, тромбоэмболии, повышенная чувствительность к менадиону.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применяется при беременности по показаниям.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуда, эритема, крапивница, бронхоспазм. Со стороны свертывающей системы крови: гемолитическая болезнь новорожденных.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с пероральными антикоагулянтами возможно уменьшение антикоагулянтного действия.

Особые указания

При заболеваниях, приводящих к нарушению оттока желчи, рекомендуется парентеральное введение. При гемофилии и болезни Верльгофа менадион неэффективен.

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.