Инструкция по применению
Викс Антигрипп Комплекс 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Порошок
Страна: Великобритания
Производитель: Рафтон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гвайфенезин+Парацетамол+Фенилэфрин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг+200 мг+10 мг/1 пак.

Описание

Препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний

Действующее вещество

Гвайфенезин+Парацетамол+Фенилэфрин

Состав

p3-zharoponizhaschie-sredstva

Форма выпуска

Порошок

Фармакокинетика

Парацетамол быстро и почти полностью всасывается из ЖКТ. После приема внутрь Cmax парацетамола в плазме достигается через 10-60 мин. Метаболизируется в печени и выводится с мочой, в основном - в виде глюкуронидов и сульфатных соединений. T1/2 составляет 1-3 ч. Гвайфенезин быстро всасывается из ЖКТ (через 25-30 мин после приема внутрь). T1/2 - 1 ч. Метаболизируется в печени окислением до #-(2-метокси-феноксИ)-молочной кислоты, которая выводится с мокротой и почками в виде неактивных метаболитов. Фенилэфрин обладает нерегулярной всасываемостью из ЖКТ и на первой стадии метаболизма подвергается воздействию моноаминоксидазы в кишечнике и печени, поэтому пероральное применение фенилэфрина снижает его биодоступность. Выводится с мочой в виде сульфатных соединений. Cmax в плазме достигается через 1-2 ч, T1/2 составляет 2-3 ч.

Показания

Симптомы простудных заболеваний и гриппа (головная боль, боль в горле, боли в теле и конечностях, заложенность носа, кашель с затрудненным отхождением вязкой мокроты, лихорадка).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет - назначают по 1 пакетику каждые 4-6 ч, но не более 4 доз (пакетиков)/сут. Максимальная суточная доза составляет 4 пакетика. Максимальная длительность применения препарата без консультации с врачом не более 5 дней. Если через 5 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, пациенту необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Нарушение функции печени, тяжелая хроническая почечная недостаточность, артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, фенилкетонурия, ИБС (острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных артерий), аортальный стеноз, тахиаритмия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, порфирия, феохромоцитома, возраст до 12 лет, беременность, период лактации, одновременный прием бета-адреноблокаторов, трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО (в т.ч. в течение 14 дней после их отмены), одновременный прием других симпатомиметических препаратов, одновременный прием других препаратов, содержащих парацетамол, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, повышенная чувствительность к гвайфенезину, парацетамолу, фенилэфрину или другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

парацетамол 500 мг гвайфенезин 200 мг фенилэфрина гидрохлорид 10 мг Вспомогательные вещества: сахароза - 2000 мг, лимонная кислота - 330 мг, винная кислота - 330 мг, натрия цикламат - 200 мг, натрия цитрат - 500 мг, аспартам - 6 мг, аскорбиновая кислота - 100 мг, калия ацесульфам - 17 мг, ароматизатор лимонный 8476 - 50 мг, ароматизатор лимонный сок - 120 мг, ароматизатор ментоловый - 100 мг, краситель хинолиновый желтый - 1 мг.

Передозировка

Рекомендуется принимать препарат максимально возможным коротким курсом и в минимальной эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов. Не следует применять препарат одновременно с другими средствами от кашля, простуды или препаратами с деконгестивным действием. Следует избегать одновременного применения препарата с другими парацетамолсодержащими лекарственными средствами, поскольку это может вызвать передозировку парацетамола. У пациентов с алкогольной болезнью печени негативные последствия передозировки выражены в большей степени.

Взаимодействие с другими препаратами

ПарацетамолАллергические реакции: редко - крапивница, анафилаксия, бронхоспазм, ангионевротический отек.Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко - кожная сыпь, частота неизвестна - синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), острый генерализованный экзантематозный пустулез.Со стороны нервной системы: редко - головокружение.Со стороны органа зрения: редко - парез аккомодации, повышение внутриглазного давления, мидриаз.Со стороны системы кроветворения: редко - апластическая анемия, метгемоглобинемия, очень редко - патологические изменения крови, такие как тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, нейтропения, лейкопения, панцитопения.Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - повышение АД.Со стороны пищеварительной системы редко - тошнота, рвота, сухость во рту, гепатотоксическое действие.Со стороны мочевыделительной системы: редко - задержка мочи, нефротоксичность (папиллярный некроз), частота неизвестна - интерстициальный нефрит.ФенилэфринСо стороны сердечно-сосудистой системы: редко - тахикардия, артериальная гипертензия, сопровождающаяся головной болью, рвотой и учащенным сердцебиением.Со стороны нервной системы: редко - бессонница, нервозность, тремор, тревога, возбужденное состояние, спутанность сознания, раздражительность и головная боль.Со стороны пищеварительной системы: часто - анорексия, тошнота и рвота.Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, крапивница, анафилаксия и бронхоспазм.ГвайфенезинСо стороны нервной системы: редко - головная боль, головокружение и сонливость.Со стороны пищеварительной системы: редко - дискомфорт в ЖКТ, тошнота, рвота и диарея.

Особые указания

Не следует применять препарат при беременности и в период грудного вскармливания.

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре