
Инструкция по применению
Вилдаглиптин Таблетки 50 мг 28 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Hemofarm
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Вилдаглиптин
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до светло-желтого цвета с фаской с двух сторон.

Действующее вещество

Вилдаглиптин

Состав

Препарат Вилдаглиптин содержит Действующим веществом является вилдаглиптин. Каждая таблетка содержит 50 мг вилдаглиптина. Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат. Препарат Вилдаглиптин содержит лактозу (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лекарственный препарат Вилдаглиптин показан к применению при сахарном диабете 2 типа у взрослых пациентов (в сочетании с диетотерапией и физическими упражнениями): в качестве монотерапии в случае неэффективности диетотерапии и физических упражнений у пациентов с наличием противопоказаний к применению/ непереносимости метформина или в случае неэффективности метформина, в комбинации с метформином в качестве начальной медикаментозной терапии при недостаточной эффективности диетотерапии и физических упражнений, в составе двухкомпонентной комбинированной терапии: с метформином или тиазолидиндионом, или с инсулином в случае неэффективности диетотерапии, физических упражнений и монотерапии этими препаратами, в составе двухкомпонентной комбинированной терапии с производными сульфонилмочевины у пациентов с недостаточным контролем гликемии на фоне максимально переносимой дозы производного сульфонилмочевины или при наличии противопоказаний к применению/ непереносимости метформина, в составе тройной комбинированной терапии: в комбинации с производными сульфонилмочевины и метформином, у пациентов, ранее получавших терапию производными сульфонилмочевины и метформином на фоне диетотерапии и физических упражнений и не достигших адекватного контроля гликемии, в составе тройной комбинированной терапии: в комбинации с инсулином и метформином, у пациентов, ранее получавших инсулин в стабильной дозе и метформин на фоне диетотерапии и физических упражнений, и не достигших адекватного контроля гликемии.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений обратитесь за консультацией к лечащему врачу. Не увеличивайте дозу препарата. Какое количество препарата Вилдаглиптин следует принимать Лечащий врач скажет, какое количество таблеток Вилдаглиптин Вам нужно принимать. Обычная доза препарата Вилдаглиптин составляет 50 мг или 100 мг в день. Дозу 50 мг следует принимать за один прием однократно утром. Дозу 100 мг следует разделить на два приема (по 50 мг) утром и вечером. В зависимости от того, как Вы отреагируете на терапию, Ваш врач может предложить более высокую или более низкую дозу. В зависимости от Вашего состояния, лечащий врач может назначить Вилдаглиптин в качестве монотерапии или в комбинации с другими гипогликемическими препаратами. Путь и (или) способ введения Вилдаглиптин следует принимать утром (однократно 50 мг) или утром и вечером (по 50 мг два раза в сутки). Таблетки проглатывают, запивая стаканом воды. Продолжительность терапии Продолжайте применение препарата Вилдаглиптин согласно рекомендациям лечащего врача. Возможно, препарат придется принимать в течение длительного периода времени. Чтобы убедиться, что лечение дает желаемый эффект, лечащий врач будет регулярно отслеживать Ваше состояние. Если лечащий врач отменил прием препарата Вилдаглиптин из-за нарушения функции печени, не рекомендуется принимать его повторно. Если у Вас есть вопросы о продолжительности лечения данным препаратом, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Противопоказания

Не применяйте препарат Вилдаглиптин в следующих случаях: если у Вас аллергия на вилдаглиптин или на другие вспомогательные вещества, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша, если у Вас сахарный диабет 1 типа, если у Вас острый или хронический метаболический ацидоз (включая диабетический кетоацидоз (осложнение, сопровождающееся быстрым снижением массы тела, тошнотой или рвотой) и лактатацидоз (избыточное накопление молочной кислоты в крови)), если у Вас имеются нарушения функции печени с повышенной активностью биохимических показателей (АЛТ, АСТ в 3 и более раза выше нормы), если у Вас хроническая сердечная недостаточность IV функционального класса (ФК).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны, полагаете, что беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу возможности применения препарата Вилдаглиптин. Не рекомендуется кормить грудью во время лечения препаратом Вилдаглиптин. Прежде чем принимать какие-либо лекарства во время беременности или в период грудного вскармливания, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Лечащий врач обсудит с Вами потенциальный риск, связанный с применением препарата Вилдаглиптин в период беременности или грудного вскармливания. Нет данных

Побочные действия

Побочные эффекты препарата «Вилдаглиптин» Препарат может вызывать побочные реакции, но не у всех пациентов. Некоторые из них — серьёзные. Срочно обратитесь к врачу, если возникли: Отёк лица, языка или горла, затруднение глотания/дыхания, сыпь или крапивница (ангионевротический отёк, ⩽ 1/1 000). Желтуха, тошнота, снижение аппетита, тёмная моча (симптомы заболеваний печени). Сильная боль в верхней части живота (возможный панкреатит). Симптомы гипогликемии (головная боль, сонливость, слабость, головокружение, спутанность сознания, раздражительность, голод, учащённое сердцебиение, потливость, нервозность): Часто (⩽ 1/10) — с метформином, сульфонилмочевиной, инсулином. Нечасто (⩽ 1/100) — при монотерапии или с тиазолидиндионом. Монотерапия «Вилдаглиптином»: Часто: головокружение. Нечасто: головная боль, запор, отёки, артралгия. Очень редко: инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит. С метформином: Часто: дрожание, головная боль, головокружение, тошнота. Нечасто: повышенная утомляемость. С сульфонилмочевиной: Часто: дрожание, головная боль, головокружение, слабость. Нечасто: запор. Очень редко: назофарингит. С тиазолидиндионом: Часто: увеличение массы тела, отёки. Нечасто: головная боль, слабость. С инсулином (с метформином или без): Часто: головная боль, озноб, тошнота, изжога. Нечасто: диарея, метеоризм. С сульфонилмочевиной и метформином: Часто: головокружение, дрожание, слабость, избыточная потливость. Пострегистрационные наблюдения (частота неизвестна): зудящая сыпь, шелушение кожи или волдыри боль в мышцах кожный васкулит холецистит. При любых нежелательных реакциях (в т. ч. не указанных здесь) проконсультируйтесь с врачом. Сообщить о побочных эффектах можно через систему сообщений государств — членов ЕАЭС.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Вилдаглиптин больше, чем следовало При передозировке препаратом Вилдаглиптин у Вас могут наблюдаться боль в мышцах, легкие и транзиторные парестезии (пощипывание, покалывание), лихорадка (высокая температура), отеки конечностей, при этом следует немедленно проконсультироваться с врачом. Вам может потребоваться медицинское наблюдение. Если есть возможность, покажите врачу упаковку. Все симптомы передозировки и изменения лабораторных показателей обратимы после прекращения применения препарата. Лечение Основной гидролизный метаболит вилдаглиптина (LAY151) может быть удален из организма путем гемодиализа. Если Вы забыли принять препарат Вилдаглиптин Если Вы забыли принять препарат, примите его, как только вспомнили. Затем примите следующую дозу в обычное время. Однако, если уже почти пришло время принять следующую дозу препарата, не принимайте пропущенную дозу. Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

Взаимодействие с другими препаратами

До начала приема препарата Вилдаглиптин сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете принимать любые другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты, по причине возможного взаимодействия с препаратом Вилдаглиптин. Некоторые лекарственные препараты могут способствовать снижению эффективности гипогликемических средств: некоторые лекарственные препараты, применяемые при воспалительных процессах (например, глюкокортикостероиды), некоторые лекарственные препараты, применяемые для снижения высокого артериального давления (например, тиазиды), некоторые лекарственные препараты (гормоны щитовидной железы), применяемые для лечения заболеваний щитовидной железы, некоторые лекарственные препараты, применяемые для сужения сосудов, для купирования признаков бронхиальной астмы (например, симпатомиметики). При одновременном применении вилдаглиптина с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) наблюдалось развитие ангионевротического отека (отек Квинке - острый отек кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки) средней степени тяжести, который разрешался самостоятельно в ходе продолжения терапии вилдаглиптином. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки в случае неуверенности касательно того, относится ли принимаемый лекарственный препарат к одному из перечисленных выше лекарственных препаратов. Прием препарата Вилдаглиптин с пищей и напитками Препарат Вилдаглиптин можно принимать во время или вне приема пищи.

Особые указания

Препарат Вилдаглиптин содержит лактозу Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Препарат Вилдаглиптин не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °С.