Инструкция по применению
Вилдаглиптин Таблетки 50 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Макиз-Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Вилдаглиптин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Препарат Вилдаглиптин представляет собой круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской, от белого до почти белого цвета, с гравировкой, нанесенной методом тиснения, «V15» с одной стороны и «H» с другой стороны.

Действующее вещество

Вилдаглиптин

Состав

Препарат Вилдаглиптин содержит Действующим веществом является вилдаглиптин. Каждая таблетка содержит 50 миллиграмм вилдаглиптина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза безводная, натрия крахмалглиголят, магния стеарат. Препарат Вилдаглиптин содержит лактозу (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лекарственный препарат Вилдаглиптин показан к применению при сахарном диабете 2 типа у взрослых пациентов (в сочетании с диетотерапией и физическими упражнениями): в качестве монотерапии в случае неэффективности диетотерапии и физических упражнений у пациентов с наличием противопоказаний к применению /непереносимости метформина или в случае неэффективности метформина, в комбинации с метформином в качестве начальной медикаментозной терапии при недостаточной эффективности диетотерапии и физических упражнений, в составе двухкомпонентной комбинированной терапии: с метформином или тиазолидиндионом, или с инсулином в случае неэффективности диетотерапии, физических упражнений и монотерапии этими препаратами, в составе двухкомпонентной комбинированной терапии с производными сульфонилмочевины у пациентов с недостаточным контролем гликемии на фоне максимально переносимой дозы производного сульфонилмочевины или при наличии противопоказаний к применению/ непереносимости метформина, в составе тройной комбинированной терапии: в комбинации с производными сульфонилмочевины и метформином, у пациентов, ранее получавших терапию производными сульфонилмочевины и метформином на фоне диетотерапии и физических упражнений и не достигших адекватного контроля гликемии, в составе тройной комбинированной терапии: в комбинации с инсулином и метформином, у пациентов, ранее получавших инсулин в стабильной дозе и метформин на фоне диетотерапии и физических упражнений, и не достигших адекватного контроля гликемии.

Способ применения и дозы

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Доза препарата Вилдаглиптин подбирается индивидуально в зависимости от Вашего состояния. Ваш лечащий врач скажет Вам точно какое количество Вилдаглиптина следует принимать. Максимальная суточная доза препарата составляет 100 мг. Дозу 50 мг в сутки следует принимать 1 раз в день утром, дозу 100 мг в сутки следует делить на 2 приема - по 50 мг утром и вечером. В зависимости от того, как Вы отреагируете на терапию, Ваш врач может предложить более высокую или более низкую дозу. В зависимости от Вашего состояния, лечащий врач может назначить Вилдаглиптин в качестве монотерапии или в комбинации с другими гипогликемическими препаратами. Особые группы пациентов Пациенты с нарушениями функции почек Если у Вас имеются заболевания почек, сообщите об этом врачу. Пациенты пожилого возраста У пациентов пожилого возраста не требуется коррекции режима дозирования препарата Вилдаглиптин. Путь и (или) способ введения Вилдаглиптин следует принимать утром (однократно 50 мг) или утром и вечером (по 50 мг два раза в сутки). Таблетки проглатывают целиком, запивая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи.

Противопоказания

Не применяйте препарат Вилдаглиптин: если у Вас аллергия на вилдаглиптин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша, если Вы беременны или кормите грудью, если у Вас сахарный диабет 1 типа, если у Вас острый или хронический метаболический ацидоз (включая диабетический кетоацидоз (осложнение, сопровождающееся быстрым снижением массы тела, тошнотой или рвотой) и лактоацидоз (избыточное накопление молочной кислоты в крови)), если у Вас имеются нарушения функции печени с повышенной активностью биохимических показателей (АЛТ, АСТ в 3 и более раз выше нормы), если у Вас тяжелая степень хронической сердечной недостаточности (IV функционального класса (ФК)), если Вы младше 18 лет, Если какое-либо из перечисленных утверждений относится к Вам (или у Вас есть сомнения), пожалуйста, сообщите об этом врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Достаточных данных по применению вилдаглиптина у беременных нет, в связи с чем препарат противопоказан во время беременности. В доклинических исследованиях была выявлена репродуктивная токсичность при применении в высоких дозах, потенциальный риск для человека неизвестен. Грудное вскармливание Препарат Вилдаглиптин противопоказан в период грудного вскармливания, поскольку неизвестно, проникает ли вилдаглиптин в грудное молоко у человека. Нет данных

Побочные действия

Вилдаглиптин: важные сведения о побочных эффектах Препарат может вызывать побочные реакции. Большинство из них не опасны, но некоторые требуют срочной медицинской помощи. Срочно обратитесь к врачу, если появились: Отёк лица, языка или горла, проблемы с дыханием/глотанием, сыпь или крапивница (⩽ 1/1 000). Желтуха, тошнота, потеря аппетита, тёмная моча (признаки проблем с печенью). Сильная боль вверху живота (возможный признак панкреатита). Симптомы гипогликемии (головная боль, сонливость, слабость, головокружение, спутанность сознания, раздражительность, голод, учащённое сердцебиение, потливость, нервозность): Часто (⩽ 1/10) — с метформином, сульфонилмочевиной, инсулином. Нечасто (⩽ 1/100) — при монотерапии или с тиазолидиндионом. Монотерапия: Часто: головокружение. Нечасто: головная боль, запор, отёки, артралгия. Очень редко: инфекции ВДП, назофарингит. С метформином: Часто: дрожание, головная боль, головокружение, тошнота. Нечасто: повышенная утомляемость. С сульфонилмочевиной: Часто: дрожание, головная боль, головокружение, слабость. Нечасто: запор. Очень редко: назофарингит. С тиазолидиндионом: Часто: увеличение массы тела, отёки. Нечасто: головная боль, слабость. С инсулином (с метформином или без): Часто: головная боль, озноб, тошнота, изжога. Нечасто: диарея, метеоризм. С сульфонилмочевиной и метформином: Часто: головокружение, дрожание, слабость, потливость. Редкие побочные эффекты (частота неизвестна): Зудящая сыпь, шелушение кожи, волдыри. Боль в мышцах. Кожный васкулит. Холецистит. При тяжёлых симптомах — немедленно обратитесь к врачу. При любых новых или необычных реакциях — проконсультируйтесь с врачом. Сообщить о побочных эффектах можно через систему сообщений государств — членов ЕАЭС.

Передозировка

Если Вы приняли препарат Вилдаглиптин больше, чем следовало При передозировке препаратом Вилдаглиптин у Вас могут наблюдаться боль в мышцах, легкие и транзиторные парестезии (пощипывание, покалывание), лихорадка (высокая температура), отеки конечностей, при этом следует немедленно проконсультироваться с врачом. Вам может потребоваться медицинское наблюдение. Если есть возможность, покажите врачу упаковку. Все симптомы передозировки и изменения лабораторных показателей обратимы после прекращения применения препарата. Лечение Основной гидролизный метаболит вилдаглиптина (LAY151) может быть удален из организма путем гемодиализа. Если Вы забыли принять препарат Вилдаглиптин Если Вы забыли принять препарат, примите его, как только вспомнили. Затем примите следующую дозу в обычное время. Однако, если уже почти пришло время принять следующую дозу препарата, не принимайте пропущенную дозу. Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Некоторые лекарственные препараты могут способствовать снижению эффективности вилдаглиптина и других противодиабетических препаратов для приема внутрь: тиазиды (так называемые мочегонные препараты), глюкокортикостероиды (гормональные средства, обычно используются для лечения воспалительных заболеваний), препараты для лечения заболеваний щитовидной железы (гормоны щитовидной железы), симпатомиметики (лекарственные средства, оказывающие стимулирующее воздействие на нервную систему). При одновременном применении вилдаглиптина с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) наблюдалось развитие ангионевротического отека (отек Квинке - острый отек кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки) средней степени тяжести, который разрешался самостоятельно в ходе в ходе продолжения терапии вилдаглиптином. Проконсультируйтесь с лечащим врачом в случае неуверенности касательно того, относится ли принимаемый лекарственный препарат к одному из вышеперечисленных.

Особые указания

Препарат Вилдаглиптин содержит лактозу Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Препарат Вилдаглиптин не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре ниже 25 °C.