Инструкция по применению
Вилдаглиптин-СЗ Таблетки 50 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Северная Звезда
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Вилдаглиптин
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические с фаской.

Действующее вещество

Вилдаглиптин

Состав

Препарат Вилдаглиптин-СЗ содержит: Действующим веществом является вилдаглиптин. Каждая таблетка содержит 50 мг вилдаглиптина. Вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая 102, лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный), карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Вилдаглиптин-СЗ предназначен для взрослых старше 18 лет. Сахарный диабет 2 типа в сочетании с диетой и физическими упражнениями: в качестве монотерапии, если нет эффекта от диет и физических упражнений у пациентов, которым нельзя принимать метформин или в случае неэффективности метформина, в комбинации с метформином в качестве начальной медикаментозной терапии, если нет эффекта от диет и физических упражнений, в составе двухкомпонентного комбинированного лечения, если нет эффекта от диет, физических упражнений и монотерапии следующими препаратами: с метформином, тиазолидиндионом или инсулином, с производными сульфонилмочевины в составе тройной комбинированной терапии: вилдаглиптин + производные сульфонилмочевины + метформин у пациентов, которые ранее получали лечение производными сульфонилмочевины и метформином с диетой и физическими упражнениями, но не достигли концентрации глюкозы в пределах нормы, в составе тройной комбинированной терапии: вилдаглиптин + инсулин + метформин у пациентов, которые ранее получали инсулин и метформин с диетой и физическими упражнениями, но не достигли концентрации глюкозы в пределах нормы. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Врач подбирает дозу препарата Вилдаглиптин-СЗ индивидуально в зависимости от эффективности и переносимости. Рекомендуемая доза составляет 50 мг 1 или 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза препарата составляет 100 мг. Дозу 50 мг в сутки принимайте 1 раз в сутки утром, дозу 100 мг в сутки делите на 2 приема - по 50 мг утром и вечером. в монотерапии рекомендуемая доза составляет 50 мг или 100 мг в сутки, в комбинированной терапии с метформином, тиазолидиндином или с инсулином (в комбинации с метформином или без метформина) рекомендуемая доза составляет 50 мг или 100 мг в сутки, в двойной комбинированной терапии с препаратами сульфонилмочевины рекомендуемая доза составляет 50 мг 1 раз в сутки утром, в тройной комбинированной терапии (вилдаглиптин + производные сульфонилмочевины + метформин) рекомендуемая доза составляет 100 мг в сутки. Пациенты пожилого возраста Коррекции дозы у пациентов пожилого возраста не требуется. Как и при применении других препаратов пациентам пожилого возраста требуется соблюдать осторожность. Пациенты с нарушением функции почек Если у Вас есть заболевания почек, сообщите об этом врачу. Применение у детей и подростков Препарат Вилдаглиптин-СЗ противопоказан для детей и подростков младше 18 лет. Путь и способ введения Принимайте таблетку внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи. Продолжительность терапии Продолжительность терапии определяет Ваш лечащий врач. Если Вы забыли принять препарат Вилдаглиптин-СЗ Если Вы пропустили прием препарата в назначенное время, примите пропущенную дозу как можно скорее. Не принимайте двойную дозу в один день. Если Вы прекратили прием препарата Вилдаглиптин-СЗ Не прекращайте прием препарата Вилдаглиптин-СЗ, не посоветовавшись с врачом. При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Вилдаглиптин-СЗ: если у Вас аллергия на вилдаглиптин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозогалактозная мальабсорбция (нарушение всасывания в кишечнике глюкозы и галактозы), если Вы беременны или у Вас период грудного вскармливания, если у Вас сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый), если у Вас острый или хронический метаболический ацидоз - нарушение кислотнощелочного баланса, включая диабетический кетоацидоз (состояние абсолютного дефицита инсулина в крови) в сочетании с комой или без. Диабетический кетоацидоз корректируют введением инсулина. Лактоацидоз - повышение уровня молочной кислоты в крови. если у Вас нарушения работы печени, а также если у Вас завышены такие показатели крови как аланинаминотрансфераза (АЛТ) или аспартатаминотрансфераза (АСТ) в 3 и более раз, если у Вас заболевания сердца, при которых Вы ощущаете дискомфорт в области сердца в состоянии покоя, которые усиливаются при любой физической нагрузке, если Ваш возраст менее 18 лет (в связи с недостаточной изученностью эффективности и безопасности).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Данные о применении вилдаглиптина у беременных женщин отсутствуют. Препарат Вилдаглиптин-СЗ противопоказан во время беременности. Грудное вскармливание Данные о выделении вилдаглиптина с грудным молоком у женщин отсутствуют. Препарат Вилдаглиптин-СЗ противопоказан в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Вилдаглиптин-СЗ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Возможно развитие серьезных нежелательных реакций, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000). Прекратите прием препарата Вилдаглиптин-СЗ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если заметите появление следующих симптомов: - затрудненное дыхание или глотание, головокружение, отек лица, губ, языка или горла, сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей (признаки ангионевротического отека). Возможно развитие серьезных нежелательных реакций неизвестной частоты (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно). Прекратите прием препарата Вилдаглиптин-

СЗ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если заметите появление следующих симптомов: темная моча, бледный стул, желтый цвет кожи и глаз, повышенная температура тела (признаки поражения печени), боль в верхней части живота, вздутие живота, слабость, потеря аппетита, жажда, повышение температуры тела, снижение артериального давления (признаки панкреатита). Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Вилдаглиптин-СЗ в монотерапии Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): головокружение Нечасто могут возникать не более чем у 1 человека из 100): снижение концентрации глюкозы в крови, которое обычно сопровождается бледностью, потливостью, раздражительностью, чувством голода, головокружением, сонливостью, слабостью, дрожью (гипогликемия), головная боль, отеки ног, запор, боли в области суставов (артралгия). Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000): инфекции верхних дыхательных путей, воспаление слизистой оболочки носа и глотки (назофарингит). в комбинации с метформином Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): снижение концентрации глюкозы в крови, которое обычно сопровождается бледностью, потливостью, раздражительностью, чувством голода, головокружением, сонливостью, слабостью, дрожью (гипогликемия), дрожь, мелкие, ритмичные, непроизвольные подергивания частей тела (тремор), головная боль, головокружение, тошнота. Нечасто могут возникать не более чем у 1 человека из 100): повышенная утомляемость в комбинации с производными сульфонилмочевины Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): снижение концентрации глюкозы в крови, которое обычно сопровождается бледностью, потливостью, раздражительностью, чувством голода, головокружением, сонливостью, слабостью, дрожью (гипогликемия), дрожь, мелкие, ритмичные, непроизвольные подергивания частей тела (тремор), головная боль, головокружение, симптомы гриппа, слабость (астения). Нечасто могут возникать не более чем у 1 человека из 100): запор Очень редко могут возникать не более чем у 1 человека из 10000): воспаление слизистой оболочки носа и глотки (назофарингит) в комбинации с тиазолидиндионом Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): увеличение массы тела, отеки ног. Нечасто могут возникать не более чем у 1 человека из 100): снижение концентрации глюкозы в крови, которое обычно сопровождается бледностью, потливостью, раздражительностью, чувством голода, головокружением, сонливостью, слабостью, дрожью (гипогликемия), головная боль, симптомы гриппа, слабость (астения). в комбинации с инсулином (с метформином или без него) Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): снижение концентрации глюкозы в крови, которое обычно сопровождается бледностью, потливостью, раздражительностью, чувством голода, головокружением, сонливостью, слабостью, дрожью (гипогликемия), головная боль, озноб, тошнота, изжога (гастроэзофагеальный рефлюкс). Нечасто могут возникать не более чем у 1 человека из 100): жидкий стул

(диарея), вздутие живота (метеоризм). в комбинации с производными сульфонилмочевины и метформином Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): снижение концентрации глюкозы в крови, которое обычно сопровождается бледностью, потливостью, раздражительностью, чувством голода, головокружением, сонливостью, слабостью, дрожью (гипогликемия), головокружение, дрожь, мелкие, ритмичные, непроизвольные подергивания частей тела (тремор), повышенное потоотделение (гипергидроз), симптомы гриппа, слабость (астения). Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Симптомы При приеме увеличенной дозы препарата в 400 мг в сутки может наблюдаться боль в мышцах, редко - чувство жжения, покалывания, "мурашек", повышение температуры тела, отеки ног, превышение норм лабораторных показателей (активность липазы). При приеме увеличенной дозы препарата до 600 мг в сутки может наблюдаться развитие отеков ног с чувством жжения, покалывания, "мурашек" и превышением норм лабораторных показателей (активность креатинфосфокиназы, С-реактивный белок, миоглобин, активность аспартатаминотрансферазы (АСТ)). Все симптомы передозировки прекращаются после отмены приема препарата. Лечение Если Вы приняли дозу препарата выше рекомендованной, Вам может потребоваться медицинская помощь. Незамедлительно обратитесь к лечащему врачу или в отделение экстренной помощи ближайшей больницы. При возможности, возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Особенно важно сообщить врачу о приеме следующих лекарственных препаратов: препараты сульфонилмочевины - лекарства для лечения сахарного диабета 2 типа, так как при одновременном приеме повышается риск нежелательных реакций, тиазиды - мочегонные средства, глюкокортикостероиды - гормональные средства, препараты гормонов щитовидной железы, симпатомиметики (например, адреналин), так как они могут снижать эффективность вилдаглиптина, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента - лекарства от повышенного артериального давления (например, каптоприл), так как при одновременном приеме повышается риск развития ангионевротического отека.

Особые указания

Перед приемом препарата Вилдаглиптин-СЗ проконсультируйтесь с лечащим врачом. Дети и подростки Не давайте препарат Вилдаглиптин-СЗ детям и подросткам до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности (препарат Вилдаглиптин-СЗ противопоказан для детей и подростков младше 18 лет). Препарат Вилдаглиптин-СЗ содержит лактозу Препарат Вилдаглиптин-СЗ содержит лактозу. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Если у Вас во время приема препарата Вилдаглиптин-СЗ отмечается головокружение, Вы должны воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами до исчезновения головокружения.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на контурной ячейковой упаковке и пачке картонной после "Годен до:". Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Храните препарат при температуре ниже 25 оС.