Инструкция по применению
Вилдарил Таблетки 50 мг 56 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Велфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Вилдаглиптин
Количество в упаковке: 56

Описание

Таблетки плоскоцилиндрические от белого до светло-жёлтого цвета с риской с одной стороны и фаской с двух сторон. Допускается мраморность.Линия разлома (риска) предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Действующее вещество

Вилдаглиптин

Состав

Препарат ВИЛДАРИЛ содержит Действующим веществом является вилдаглиптин. Каждая таблетка содержит 50 мг вилдаглиптина. Прочими ингредиентами являются: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза безводная, карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат. Препарат ВИЛДАРИЛ содержит лактозу (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат ВИЛДАРИЛ показан к применению у взрослых старше 18 лет при сахарном диабете 2 типа (в сочетании с диетой и физическими упражнениями): без применения других лекарств (монотерапия) в случае, если Вам не помогли диета и физические упражнения и у Вас есть противопоказания к приему метформина или если метформин не оказался эффективным для Вас, одновременно с метформином в качестве начального лечения, если Вам не помогли диета и физические упражнения, одновременно с метформином или тиазолидиндионом, или с инсулином, если Вам не помогли диета и физические упражнения и лечение только этими перечисленными препаратами, одновременно с производными сульфонилмочевины, если Вам не удается достаточно хорошо контролировать концентрацию глюкозы в Вашей крови на фоне максимально переносимой дозы производного сульфонилмочевины или если у Вас есть противопоказания к приему метформина, одновременно с производными сульфонилмочевины и метформином, если раньше Вы получали лечение только производными сульфонилмочевины и метформином при соблюдении диеты и проведении физических упражнений, но так и не смогли достичь достаточно хорошего контроля концентрации глюкозы в Вашей крови, одновременно с инсулином и метформином, если раньше Вы получали инсулин в стабильной дозе и метформин на фоне диеты и физических упражнений, но так и не смогли достичь достаточно хорошего контроля концентрации глюкозы в Вашей крови.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза: Лечащий врач скажет Вам какое количество таблеток ВИЛДАРИЛ нужно принимать. Обычная доза препарата ВИЛДАРИЛ составляет 50 мг или 100 мг в день: дозу 50 мг следует принимать за один прием однократно утром, дозу 100 мг следует разделить на два приема (по 50 мг) - утром и вечером. В зависимости от того, как Вы отреагируете на лечение, Ваш врач через некоторое время может назначить Вам более высокую или более низкую дозу. В зависимости от Вашего состояния, лечащий врач может назначить ВИЛДАРИЛ в качестве монотерапии или в комбинации с другими гипогликемическими препаратами. В зависимости от тяжести Вашего заболевания лечащий врач может назначить Вам принимать только препарат ВИЛДАРИЛ или лекарственный препарат ВИЛДАРИЛ в комбинации с другими лекарствами схожего действия. Путь и (или) способ введения Внутрь. Таблетки проглатывайте целиком, не разжевывая, запивая стаканом воды. Продолжительность терапии Продолжайте принимать препарат ВИЛДАРИЛ согласно рекомендациям лечащего врача. Возможно, препарат придется принимать в течение длительного периода времени. Чтобы убедиться, что лечение дает желаемый эффект, лечащий врач будет регулярно отслеживать Ваше состояние. Если лечащий врач отменил прием препарата ВИЛДАРИЛ из-за нарушения функции печени, не начинайте принимать его повторно. Если Вы забыли принять препарат ВИЛДАРИЛ Если Вы забыли принять препарат, примите его, как только вспомнили. Затем примите следующую дозу в обычное время. Однако, если уже почти пришло время принять следующую дозу препарата, не принимайте пропущенную дозу. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Если Вы прекратили прием препарата ВИЛДАРИЛ Не прекращайте принимать препарат, только если Вам это не сказал сделать Ваш лечащий врач. Самовольное прекращение лечения может ухудшить Ваше заболевание. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат ВИЛДАРИЛ: если у Вас аллергия на вилдаглиптин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6.1 листка-вкладыша), если Вы беременны или кормите грудью, если у Вас сахарный диабет 1 типа, если у Вас острое или хроническое повышение кислотности в организме (метаболический ацидоз), например, по причине значительного повышения в крови кетоновых тел (диабетический кетоацидоз) или молочной кислоты (лактатацидоз) если у Вас есть нарушения функции печени с повышенной активностью «печеночных» ферментов в анализе крови (когда АЛТ и/или АСТ в 3 и более раза выше нормы), если Ваше сердце с трудом способно перекачивать кровь по организму (хроническая сердечная недостаточность IV функционального класса), если Ваш возраст менее 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если Вы беременны, то не принимайте препарат ВИЛДАРИЛ, поскольку он Вам противопоказан. Не кормите ребенка грудью во время лечения препаратом ВИЛДАРИЛ. Обсудите с лечащим врачом Ваше дальнейшее лечение.

Побочные действия

Как и в случае с любыми другими препаратами, на фоне применения препарата ВИЛДАРИЛ могут развиваться побочные эффекты, однако это происходит не у всех пациентов. Некоторые нежелательные реакции могут быть серьезными. Прекратите применение препарата ВИЛДАРИЛ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас развились любые из следующих симптомов: Отек лица, языка или горла, затруднение глотания или дыхания, внезапное появление сыпи или крапивницы (симптомы тяжелой аллергической реакции, приводящей к ангионевротическому отеку). Редко (может наблюдаться не более чем у 1 из 1000 пациентов). Желтоватый цвет кожи и/или склер, тошнота, снижение аппетита, потемнение мочи (возможные симптомы заболеваний печени). Частота неизвестна. Сильная боль в верхнем отделе живота (как возможный симптом панкреатита). Частота неизвестна. Головная боль, сонливость, слабость, головокружение, спутанность сознания, раздражительность, голод, учащенное сердцебиение, потливость, нервозность (как возможные симптомы низкого уровня глюкозы в крови, так называемой гипогликемии). Часто (может наблюдаться не более чем у 1 человека из 10 пациентов) при комбинациях препарата ВИЛДАРИЛ и метформина, производных сульфонилмочевины, инсулина инсулина (совместно с метформином или без него), с препаратами сульфонилмочевины и метформином. Нечасто (может

наблюдаться не более чем у 1 человека из 100 пациентов) при монотерапии препаратом ВИЛДАРИЛ, при комбинации препарата ВИЛДАРИЛ и производных тиазолидиндиона. Другие возможные нежелательные реакции Другие возможные нежелательные реакции перечислены ниже. Если эти нежелательные реакции приобретают тяжелое течение, сообщите об этом лечащему врачу, работнику аптеки или медицинскому работнику. При монотерапии препаратом ВИЛДАРИЛ могут наблюдаться следующие нежелательные реакции: Часто: головокружение. Нечасто: головная боль, запор, опухшие руки, лодыжки и ступни (отеки), артралгия (боль в суставах). Очень редко: инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит (воспаление верхних дыхательных путей, насморк). При комбинации препарата ВИЛДАРИЛ и метформина могут наблюдаться следующие нежелательные реакции: Часто: дрожание, головная боль, головокружение, тошнота. Нечасто: повышенная утомляемость. При комбинации препарата ВИЛДАРИЛ и производных сульфонилмочевины могут наблюдаться следующие нежелательные реакции: Часто: дрожание, головная боль, головокружение, слабость. Нечасто: запор. Очень редко: назофарингит. При комбинации препарата ВИЛДАРИЛ и производных тиазолидиндиона могут наблюдаться следующие нежелательные реакции: Часто: увеличение массы тела, опухшие руки, лодыжки и ступни (отеки). Нечасто: головная боль, слабость. При комбинации препарата ВИЛДАРИЛ и инсулина (совместно с метформином или без него) могут наблюдаться следующие нежелательные реакции: Часто: головная боль, озноб, тошнота, изжога. Нечасто: диарея, метеоризм (вздутие живота). При комбинации препарата ВИЛДАРИЛ с препаратами сульфонилмочевины и метформином могут наблюдаться следующие нежелательные реакции: Часто: головокружение, дрожание, слабость, избыточная потливость. Пострегистрационные исследования могут наблюдаться следующие нежелательные реакции (частота неизвестна): Зудящая сыпь, шелушение кожи или волдыри, боль в мышцах, кожный васкулит (поражение мелких или средних сосудов кожи). Если Вы заметите какие-либо нежелательные реакции, не указанные в настоящем вкладыше, проконсультируйтесь с лечащим врачом, фармацевтом или медицинским работником. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке- вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарат ВИЛДАРИЛ больше, чем следовало При передозировке препаратом ВИЛДАРИЛ у Вас могут наблюдаться боль в мышцах, пощипывание, покалывание на коже (легкие и транзиторные парестезии), лихорадка (высокая температура), отеки конечностей. Если Вы ощущаете эти симптомы после передозировки препарата, проконсультируйтесь с врачом. Вам может потребоваться медицинское наблюдение и/или медицинская помощь. Если есть возможность, возьмите с собой и покажите врачу упаковку. Все симптомы передозировки и изменения в лабораторных анализах обратимы после прекращения приема препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Другие препараты и препарат ВИЛДАРИ Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Некоторые препараты могут способствовать снижению эффективности препарата ВИЛДАРИЛ: некоторые лекарственные препараты, применяемые при воспалительных процессах (например, глюкокортикостероиды), некоторые лекарственные препараты, применяемые для снижения высокого артериального давления (например, тиазиды), некоторые лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний щитовидной железы (гормоны щитовидной железы), некоторые лекарственные препараты, применяемые для сужения сосудов, для лечения бронхиальной астмы (например, симпатомиметики). При одновременном приеме препарата ВИЛДАРИЛ с препаратами, применяемыми для снижения артериального давления (так называемыми ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента) наблюдалось развитие аллергического (ангионевротического) отека кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки средней степени тяжести, который разрешался самостоятельно в ходе продолжения лечения вилдаглиптином. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки в случае неуверенности касательно того, относится ли принимаемый Вами лекарственный препарат к одной из перечисленных выше групп лекарств. Прием препарата ВИЛДАРИЛ с пищей Препарат ВИЛДАРИЛ можно принимать как во время, так и вне приема пищи.

Особые указания

Особые указания и меры предосторожности Перед приемом препарата ВИЛДАРИЛ проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу: если у Вас сахарный диабет 1 типа (когда Ваша поджелудочная железа не вырабатывает или почти не вырабатывает инсулин) или у Вас диабетический кетоацидоз, если Ваше сердце с трудом способно перекачивать кровь по организму (хроническая сердечная недостаточность), если у Вас самая тяжелая (терминальная) стадия хронической болезни почек и Вам систематически требуется проходить процедуру очистки крови (гемодиализ), если у Вас есть нарушение функции печени или появилось желтое окрашивание кожи и белков глаз (желтуха), ощущается тяжесть и/или дискомфорт в правом подреберье, наблюдается обесцвечивание кала и сильное потемнение мочи, что также может говорить о развитии проблем с печенью при приеме препарата. Врач назначит Вам обследование печени перед началом приема препарата, а затем 1 раз в 3 месяца в течение первого года лечения, а начиная со второго года - периодически. При развитии проблем с печенью нужно прекратить прием препарата и не принимать его даже после нормализации функции печени, если Вы принимаете препараты сульфонилмочевины, которые могут провоцировать сильное снижение концентрации глюкозы в крови (гипогликемию), если у Вас было когда-либо острое воспаление поджелудочной железы (острый панкреатит), если у Вас редко встречающаяся наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Дети и подростки Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность не установлены. Препарат ВИЛДАРИЛ содержит лактозу В препарате содержится лактоза (молочный сахар). Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре ниже 25 °С в оригинальной упаковке (блистер в пачке или банка в пачке) для защиты от света.